

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

十味敗毒湯エキス錠クラシエ

(ジュウミハイドクトウ)

特徴

- 「十味敗毒湯」は、我が国江戸時代、世界で初めて乳癌の麻酔手術を行った世界的な医学者華岡青洲によって創られた「瘍科方箋」に記載されている薬方です。
- 癬（できもの）や急性で発赤し腫れて痛みのある化膿性の皮膚疾患、湿疹、じんましんなどがゆみや熱をもったり化膿するおそれのある皮膚疾患に使われています。

⚠️ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
(4) 胃腸の弱い人
(5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 1ヵ月位（化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
3. 本剤の服用により、まれに症状が進行することもあるので、このような場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能

体力中等度なものの皮膚疾患で、発赤があり、ときに化膿するものの次の諸症：化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期、じんましん、湿疹・皮膚炎、水虫

用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	4錠	3回
15才未満7才以上	3錠	
7才未満5才以上	2錠	
5才未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分

成人1日の服用量12錠(1錠400mg)中、次の成分を含んでいます。
十味敗毒湯エキス ……………2,000mg

〔サイコ・キキョウ・センキュウ・ブクリョウ・レンギョウ・オウヒ〕
各1.5g、ボウフウ・ドクカツ各1.0g、カンゾウ・ケイガイ各0.5g、
ショウキョウ0.16gより抽出。

添加物として、乳糖、ステアリン酸Mg、CMC-Ca、セルロース、
メタケイ酸アルミン酸Mg、水酸化Al/Mgを含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(ビン包装の場合は、密栓して保管してください。なお、ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開栓後は不要となりますのですててください。)
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5)水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。
- (6)4錠分包の場合、1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管してください。なお、2日を過ぎた場合には服用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<https://www.pmda.go.jp/>
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334
受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ www.kracie.co.jp

発売元 **クラシエ薬品株式会社**
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元 **クラシエ株式会社**
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

“Kracie” Kampo

Jumihaidokuto Extract Tablets (96 tablets)

For people with suppurative skin diseases or eczema

Ingredients

The daily dose of 12 tablets (400 mg/packet) contains 2,000 mg of Jumihaidokuto extract from the following mixed crude drugs;

Bupleurum Root 1.5 g, Platycodon Root 1.5 g, Cnidium Rhizome 1.5 g, Poria Sclerotium 1.5 g, Forsythia Fruit 1.5 g, Cherry Bark 1.5 g, Saposhnikovia Root and Rhizome 1.0 g, Aralia Rhizome 1.0 g, Glycyrrhiza 0.5 g, Schizonepeta Spike 0.5 g, Ginger 0.16 g.

As inactive ingredients, this medicine contains Lactose, Magnesium Stearate, Carmellose Calcium, Cellulose, Magnesium Aluminometasilicate, and Magnesium Aluminum Hydroxide.

(Precautions relating to Ingredients)

Due to this medicine's use of extract from natural ingredients (crude drugs), there may be slight color variations between tablets.

Indications

Following symptoms in persons with moderate physical strength who have skin disease with redness which is sometimes suppurating: Early stage of suppurative or acute skin disease, rash, eczema/dermatitis, and athlete's foot.

Dosage and administration

Take the following dosages 3 times a day with water or warm water before or between meals.

Adults (15 years and over) - 4 tablets

14 - 7 years - 3 tablets

7 - 5 years - 2 tablets

Less than 5 years - Do not use

(Precautions of Dosage and Administration)

When allowing children to take the medicine, a guardian must be present to watch and tell such them how to take it.

Precautions for use

Consultation

1. The following persons should contact a physician, pharmacist, or registered salesperson for a consultation before administration.
 - (1) Patients undergoing medical treatment from a physician.
 - (2) Pregnant women or women suspected of being pregnant.
 - (3) Persons who is physically weak (declining of physical strength or constitutional weakness).
 - (4) Persons who have gastrointestinal weakness.
 - (5) Patients who have experienced rash/redness, itching, etc. with drugs, etc.
2. When symptoms do not improve even after taking the medicine for about 1 month (for about 1 week if you take this medicine for early stage of suppurative or acute skin disease), stop taking this medicine and consult a physician, pharmacist or registered salesperson, being sure to take this instruction leaflet with you.
3. While taking this medicine, symptoms may rarely progress. In such cases stop taking this medicine and consult a physician, pharmacist or registered salesperson, being sure to take this instruction leaflet with you.