

日本語説明

芎帰調血飲エキスFC錠

【第2類医薬品】

薬効

体力中等度以下のものの次の諸症。ただし産後の場合は体力に関わらず使用できる。： 月経不順、産後の神経症・体力低下



用法・容量

食前又は食間に水又は白湯にて服用。

| 年齢 | 1回の服用量 | 1日服用回数 |
|-----------|---------|--------|
| 成人（15才以上） | 3錠 | 3回 |
| 5-15才 | 2錠 | |
| 5才未満 | 服用しないこと | |

原材料名・成分表示

成人1日の服用量9錠（1錠405mg）中、下記材料から芍婦調血飲エキス...2,300mgを含有、下記材料より抽出

| | |
|--------|--------|
| トウキ | 1.0g |
| センキュウ | 1.0g |
| ジオウ | 1.0g |
| ビャクジュツ | 1.0g |
| ブクリョウ | 1.0g |
| チンピ | 1.0g |
| ウヤク | 1.0g |
| コウブシ | 1.0g |
| ボタンピ | 1.0g |
| ヤクモソウ | 0.75 g |
| タイソウ | 0.75 g |
| カンキョウ | 0.75 g |
| カンゾウ | 0.5 g |

添加物として、タルク、二酸化ケイ素、クロスCMC-Na、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、カルナウバロウを含有する。



INDICATIONS

for individuals with moderate or below average physical strength who experience menstrual irregularities, postpartum neurosis, and physical weakness. However, it can be used after childbirth regardless of physical strength.



DOSAGE

Take the following dosages with water or warm water before or between meals

| Age | One dosage | Daily dosage |
|-------------------|------------|--------------|
| 15 years or older | 3 tablets | 3 times |
| 5-15 years | 2 tablets | |
| Under 5 years | Do not use | |

INGREDIENTS

In the daily dose of 9 tablets (1 tablet 405mg) for adults, it contains the following components: 2300 mg of powdered kyukichoketsuin extract, extracted from:

| | |
|---------------------------|--------|
| Angelica sinensis | 1.0g |
| Ligusticum chuanxiong | 1.0g |
| Rehmannia glutinosa | 1.0g |
| Atractylodes macrocephala | 1.0g |
| Poria cocos | 1.0g |
| Citrus reticulata | 1.0g |
| Cyperus rotundus | 1.0g |
| Lindera aggregata | 1.0g |
| Moutan cortex | 1.0g |
| Leonurus japonicus | 0.75 g |
| Ziziphus jujuba | 0.75 g |
| Zingiber officinale | 0.75 g |
| Glycyrrhiza uralensis | 0.5 g |

As additives, it contains talc, silicon dioxide, cross CMC-Na, CMC-Ca, Mg stearate, cellulose, hypromellose, macrogol and carnauba wax.

中文說明

芎歸調血飲片劑
【第二類醫藥品】
功能和效果

適用於月經不調、產後神經衰弱、體質虛弱、體力中等以下者。產後不管體力強弱都適用。


用法和用量

飯前或飯間用冷水或熱水服用。

| 年齡 | 1次用量 | 1天服用次數 |
|-----------|------|--------|
| 15歲及以上成人 | 3片 | 3次 |
| 5歲以上未滿15歲 | 2片 | |
| 5歲以下 | 請勿使用 | |

成分和含量

成人每日服用量為9片（每片405毫克），含以下草藥提取物2,300毫克：

| | |
|-----|--------|
| 當歸 | 1.0g |
| 川芎 | 1.0g |
| 生地黃 | 1.0g |
| 白朮 | 1.0g |
| 茯苓 | 1.0g |
| 陳皮 | 1.0g |
| 烏藥 | 1.0g |
| 香附子 | 1.0g |
| 牡丹皮 | 1.0g |
| 益母草 | 0.75 g |
| 大棗 | 0.75 g |
| 乾姜 | 0.75 g |
| 甘草 | 0.5 g |

作為添加物，含有滑石粉、二氧化矽、交聯羧甲基纖維素鈉、羧甲基纖維素鈣、硬脂酸鎂、纖維素、羥丙基甲基纖維素、聚乙二醇、卡那華蠟。

【第二类医药品】

功能和效果

适用于月经不调、产后神经衰弱、体质虚弱、体力中等以下者。产后不管体力强弱都适用。



用法和用量

饭前或饭间用冷水或热水服用。

| 年龄 | 1次用量 | 1天服用次数 |
|-----------|------|--------|
| 15岁及以上成人 | 3片 | 3次 |
| 5岁以上未满15岁 | 2片 | |
| 未满5岁 | 请勿服用 | |

成分和含量

成人每日服用量为9片（每片405毫克），含以下草药提取物2,300毫克：

| | |
|-----|--------|
| 当归 | 1.0g |
| 川芎 | 1.0g |
| 生地黄 | 1.0g |
| 白朮 | 1.0g |
| 茯苓 | 1.0g |
| 陈皮 | 1.0g |
| 乌药 | 1.0g |
| 香附子 | 1.0g |
| 牡丹皮 | 1.0g |
| 益母草 | 0.75 g |
| 大枣 | 0.75 g |
| 干姜 | 0.75 g |
| 甘草 | 0.5 g |

作为添加物，含有滑石粉、二氧化矽、交联羧甲基纤维素钠、羧甲基纤维素钙、硬脂酸镁、纤维素、羟丙基甲基纤维素、聚乙二醇、卡那华蜡。