

Kracie

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

「クラシエ」漢方加味逍遙散料エキス錠 (カミショウヨウサン)

特 徴

- 「加味逍遙散」は、「逍遙散」に生薬の牡丹皮ボタンビと山梔子サンシシを加えたもので、「万病回春」マンビョウカイシュンに記載されている薬方です。
- 体力中等度以下で疲れやすい方の冷え症や、月経不順などに効果があります。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 胃腸の弱い人
(4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

体力中等度以下で、のぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、精神不安やいらだちなどの精神神経症状、ときに便秘の傾向のあるものの次の諸症：冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症、不眠症

(注)「血の道症」とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状を指します。

用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	4錠	3回
15才未満7才以上	3錠	
7才未満5才以上	2錠	
5才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分

成人1日の服用量12錠（1錠380mg）中、次の成分を含んでいます。
加味逍遙散エキス（3/5量）……………2,460mg

トウキ・シャクヤク・ビャクジュツ・ブクリョウ・サイコ各1.8g、
ボタンピ・サンシシ各1.2g、カンゾウ0.9g、ショウキョウ0.3g、
ハッカ0.6gより抽出。

添加物として、セルロース、二酸化ケイ素、クロスCMC-Na、クロス
ポビドン、ステアリン酸Mgを含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物（生薬）のエキスをを用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

また本剤は、生薬精油成分（においのする成分）を含んだエキスを使用しておりますので、漢方薬特有のにおいがします。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)ビンの中の話物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開栓後は不要となりますので捨ててください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6)水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<https://www.pmda.go.jp/>
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ 薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334
受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ www.kracie.co.jp

発売元 **クラシエ 薬品株式会社**
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元 **クラシエ株式会社**
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

“Kracie” Kampo

Kamishoyosanryo Extract Tablets (96 tablets)

Ingredients

The daily dose of 12 tablets (380 mg/tablet) contains 2,460 mg of Kamishoyosan extract from the following mixed crude drugs;

Japanese Angelica Root 1.8 g, Peony Root 1.8 g, Atractylodes Rhizome 1.8 g, Poria Sclerotium 1.8 g, Bupleurum Root 1.8 g, Moutan Bark 1.2 g, Gardenia Fruit 1.2 g, Glycyrrhiza 0.9 g, Ginger 0.3 g, Mentha Herb 0.6 g.

As inactive ingredients, this medicine contains Cellulose, Silicon Dioxide, Croscarmellose sodium, Crospovidone, and Magnesium Stearate.

(Precautions relating to Ingredients)

Due to this medicine's use of extract from natural ingredients (crude drugs), there may be slight color variations between tablets.

And due to the use of extract including crude drug essential oil components (components that produce a scent), there may be a scent characteristic of kampo (traditional Chinese medicine).

Indications

Following symptoms in persons with moderate or poor physical strength who get tired easily, suffered from flash feeling, shoulder stiffness and neuropsychiatric symptoms including anxiety and irritation, and sometimes experience a constipation tendency:

Over-sensitiveness to cold, weak constitution, menstrual irregularity, dysmenorrhea, menopausal disorders, chi-no-michi-sho*, and insomnia.

*Chi-no-michi-sho is a generic term for neuropsychiatric symptoms such as anxiety and irritation, and physical symptoms due to fluctuation of female hormones caused by menstruation, pregnancy, childbirth, and menopause.

Dosage and Administration

Take the following dosages 3 times a day with water or warm water before or between meals.

Adults (15 years and over) - 4 tablets /dose

14 - 7 years - 3 tablets /dose

7 - 5 years - 2 tablets /dose

Less than 5 years - Do not use /dose

(Precautions of Dosage and Administration)

When allowing children to take the medicine, a guardian must be present to watch and tell such them how to take it.

Precautions

Consultation

1. The following persons should contact a physician, pharmacist, or registered salesperson for a consultation before administration.

(1) Patients undergoing medical treatment from a physician.

(2) Pregnant women or women suspected of being pregnant.

(3) Persons who have gastrointestinal weakness.

(4) Patients who have experienced rash/redness, itching, etc. with drugs, etc.

2. If the following symptoms are observed after taking this drug, these may be adverse reactions, so immediately discontinue the use of this drug, and show this document to your physician, pharmacist, or registered salesperson for a consultation.

Affected areas: Symptoms

Skin: Rash/redness, itching

Gastrointestinal system: Nausea and vomiting, loss of appetite, feeling of discomfort in the stomach

The following serious symptoms may occur in rare cases, immediately seek medical aid.

Symptom names: Symptoms

Hepatic function failure: Symptoms, such as fever, itching, rash, jaundice (yellowing of skin and white of eyes), brown urine, general malaise, loss of appetite, etc. may occur.

Mesenteric phlebosclerosis: Abdominal pain, diarrhea, constipation, abdominal distension, etc. may occur repeatedly with long-term oral administration.

3. The following symptoms may be observed after taking this drug. If these symptoms persist or worsen, discontinue the use of this drug, and show this document to your physician, pharmacist, or registered salesperson for a consultation.

Diarrhea

4. When symptoms do not improve even after taking the medicine for about 1 month, stop taking this medicine and consult a physician, pharmacist or registered salesperson, being sure to take this instruction leaflet with you.

5. If you take this medicine for a long time, consult a physician, pharmacist, or registered salesperson.