

柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠 [180錠]

成分

成人1日の服用量9錠（1錠400mg）中

柴胡加竜骨牡蛎湯エキス・・・1,950mg

〔サイコ2.5g、ハンゲ2.0g、ブクリョウ・ケイヒ各1.5g、オウゴン・タイソウ・ニンジン・リュウコツ・ボレイ各1.25g、ショウキョウ0.4g、ダイオウ0.5gより抽出。〕

添加物として、タルク、クロスCMC-Na、CMC-Ca、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、セルロースを含有する。

（成分に関連する注意）本剤は天然物（生薬）のエキスを用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

効能

体力中等度以上で、精神不安があつて、動悸、不眠、便秘などを伴う次の諸症：高血圧の随伴症状（動悸、不安、不眠）、神経症、更年期神経症、小児夜泣き、便秘

用法・用量

1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

成人（15才以上） 1回3錠

15才未満5才以上 1回2錠

5才未満 服用しないこと

（用法・用量に関連する注意）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください

他の瀉下薬(下剤)

2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人

(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)

(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人

(5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位／症状

皮膚：発疹・発赤、かゆみ

消化器：はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。

その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称／症状名

間質性肺炎：階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。

肝機能障害：発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

軟便、下痢

4. 1ヵ月位（小児夜泣き、便秘に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

“Kracie” Kampo

Saikokaryukotsuboreito Extract Tablets (180 tablets)

Ingredients

The daily dose of 9 tablets (400 mg/tablet) contains 1,950 mg of Saikokaryukotsuboreito extract from the following mixed crude drugs;

Bupleurum Root 2.5 g, Pinellia Tuber 2.0 g, Poria Sclerotium 1.5 g, Cinnamon Bark 1.5 g, Scutellaria Root 1.25 g, Jujube 1.25 g, Ginseng 1.25 g, Longgu 1.25 g, Oyster Shell 1.25 g, Ginger 0.4 g, Rhubarb 0.5 g.

As inactive ingredients, this medicine contains Talc, Croscarmellose Sodium, Carmellose Calcium, Anhydrous Silicic Acid, Magnesium Stearate, and Cellulose.

(Precautions relating to Ingredients)

Due to this medicine's use of extract from natural ingredients (crude drugs), there may be slight color variations between tablets.

Indications

Following symptoms in persons with moderate or more physical strength who suffer from mental anxiety, palpitation, insomnia and constipation: Accessory symptoms of hypertension (palpitations, anxiety, insomnia), neurosis, menopausal neurosis, baby's night crying, and constipation.

Dosage and administration

Take the following dosages 3 times a day with water or warm water before or between meals.

Adults (15 years and over) - 3 tablets

14 - 5 years - 2 tablets

Less than 5 years - Do not use

(Precautions of Dosage and Administration)

When allowing children to take the medicine, a guardian must be present to watch and tell such them how to take it.

Precautions for use

When not to use the product

(If you do not follow these instructions, the current symptoms may worsen or adverse reactions are more likely to occur.)

1. This medicine should not be taken together with the following medicines:

Other cathartic agents

2. Nursing women should either not take this medicine or stop nursing while taking this medicine.

Consultation

1. The following persons should contact a physician, pharmacist, or registered salesperson for a consultation before administration.

(1) Patients undergoing medical treatment from a physician.

(2) Pregnant women or women suspected of being pregnant.

(3) Persons who is physically weak (declining of physical strength or constitutional weakness).

(4) Persons with weak stomach and intestine who have a tendency to diarrhea, diarrhea with severe abdominal pain.

(5) Patients who have experienced rash/redness, itching, etc. with drugs, etc.

2. If the following symptoms are observed after taking this drug, these may be adverse reactions, so immediately discontinue the use of this drug, and show this document to your physician, pharmacist, or registered salesperson for a consultation.

Affected areas: Symptoms

Skin: Rash/redness, itching

Gastrointestinal system: Diarrhea with severe abdominal pain, abdominal pain

The following serious symptoms may occur in rare cases, immediately seek medical aid.

Symptom names: Symptoms

Interstitial pneumonia: Shortness and/or difficulties of breath when go upstairs or overwork, sudden dry cough and/or fever and it continuance.

Hepatic function failure: Symptoms, such as fever, itching, rash, jaundice (yellowing of skin and white of eyes), brown urine, general malaise, loss of appetite, etc. may occur.

3. The following symptoms may be observed after taking this drug. If these symptoms persist or worsen, discontinue the use of this drug, and show this document to your physician, pharmacist, or registered salesperson for a consultation.

Soft stool, diarrhea

4. When symptoms do not improve even after taking the medicine for about 1 month (for about 1 week if you take this medicine for baby's night crying, and constipation), stop taking this medicine and consult a physician, pharmacist or registered salesperson, being sure to take this instruction leaflet with you.