

抑肝散加陳皮半夏エキス錠 [240錠]

成分

成人1日の服用量12錠（1錠345mg）中

抑肝散加陳皮半夏エキス・・・2,500mg

〔ハンゲ2.5g、ビャクジュツ・ブクリョウ各2.0g、センキュウ・チンピ・トウキ・チョウトウコウ各1.5g、サイコ1.0g、カンゾウ0.75gより抽出。〕

添加物として、タルク、クロスCMC-Na、二酸化ケイ素、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、カルナウバロウを含有する。

（成分に関連する注意）本剤は天然物（生薬）のエキスを用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

効能

体力中等度をめやすとして、やや消化器が弱く、神経がたかぶり、怒りやすい、イライラなどがあるものの次の諸症：神経症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症（神経過敏）、更年期障害、血の道症、歯ぎしり

（注）「血の道症」とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状を指します。

用法・用量

1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

成人（15才以上） 1回4錠

15才未満7才以上 1回3錠

7才未満5才以上 1回2錠

5才未満 服用しないこと

（用法・用量に関連する注意）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人

(3) 胃腸の弱い人

(4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位／症状

皮膚：発疹・発赤、かゆみ

3. 1カ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

“Kracie” Kampo

Yokukansankachimpihange Extract Tablets (240 tablets)

Ingredients

The daily dose of 12 tablets (345 mg/packet) contains 2,500 mg of Yokukansankachimpihange extract from the following mixed crude drugs; Pinellia Tuber 2.5 g, Atractylodes Rhizome 2.0 g, Poria Sclerotium 2.0 g, Cnidium Rhizome 1.5 g, Citrus Unshiu Peel 1.5 g, Japanese Angelica Root 1.5 g, Uncaria Hook 1.5 g, Bupleurum Root 1.0 g, Glycyrrhiza 0.65 g.

As inactive ingredients, this medicine contains Talc, Croscarmellose Sodium, Silicon Dioxide, Carmellose Calcium, Magnesium Stearate, Cellulose, Hypromellose, Macrogol, and Carnauba Wax.

(Precautions relating to Ingredients)

Due to this medicine's use of extract from natural ingredients (crude drugs), there may be slight color variations between tablets.

Indications

Following symptoms in persons with moderate physical strength who complain of slight gastrointestinal weakness, tend to get easily excited, and become irritated easily: Neurosis, insomnia, baby's night crying, infantile gastrointestinal disorders (Nervousness), menopausal disorders, chi-no-michi-sho*, and bruxism. *Chi-no-michi-sho is a generic term for neuropsychiatric symptoms such as anxiety and irritation, and physical symptoms due to fluctuation of female hormones caused by menstruation, pregnancy, childbirth, and menopause.

Dosage and administration

Take the following dosages 3 times a day with water or warm water before or between meals.

Adults (15 years and over) - 4 tablets

14 - 7 years - 3 tablets

7 - 5 years - 2 tablets

Less than 5 years - Do not use

(Precautions of Dosage and Administration)

When allowing children to take the medicine, a guardian must be present to watch and tell such them how to take it.

Precautions for use

Consultation

1. The following persons should contact a physician, pharmacist, or registered salesperson for a consultation before administration.

(1) Patients undergoing medical treatment from a physician.

(2) Pregnant women or women suspected of being pregnant.

(3) Persons who have gastrointestinal weakness.

(4) Patients who have experienced rash/redness, itching, etc. with drugs, etc.

2. If the following symptoms are observed after taking this drug, these may be adverse reactions, so immediately discontinue the use of this drug, and show this document to your physician, pharmacist, or registered salesperson for a consultation.

Affected areas: Symptoms

Skin: Rash/redness, itching

3. When symptoms do not improve even after taking the medicine for about 1 month (for about 1 week if you take this medicine for baby's night crying), stop taking this medicine and consult a physician, pharmacist or registered salesperson, being sure to take this instruction leaflet with you.