

Kracie

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

麻子仁丸料エキス錠クラシエ (マシニンガン)

特 徴

- 「麻子仁丸」は、漢方の古典といわれる中国の医書「傷寒論」^{ショウカンロン}に記載されている薬方で、主薬の麻子仁をはじめ杏仁・大黄など6つの配合生薬からなる漢方処方です。
- 大便秘結して固く快通しない便秘に対し、便を軟化・潤滑にすることにより便秘を改善します。
- 大腸の運動を整えて、自然に近い穏やかなお通じをもたらす効果があります。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬（下剤）
- 2.授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

🗨️ 相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)胃腸が弱く下痢しやすい人
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

- 3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
- 4.5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

体力中等度以下で、ときに便が硬く塊状なものの次の諸症：便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの（にきび）・食欲不振（食欲減退）・腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和

用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	4錠	3回
15才未満	服用しないこと	

(裏面につづきます)

成分

成人1日の服用量12錠(1錠303mg)中、次の成分を含んでいます。
麻子仁丸料エキス粉末 ……………1,800mg
〔マシニン2.2g、シャクヤク・キジツ・コウボク各1.1g、ダイオウ〕
〔1.925g、キョウニン1.375gより抽出。〕
添加物として、ステアリン酸Mg、ケイ酸Al、CMC-Ca、セルロース、ヒプロメロース、ヒプロメロースフタル酸エステル、マクロゴール、トリアセチン、三二酸化鉄、青色2号を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)ビンの中の話物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開栓後は不要となりますのですててください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6)水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<https://www.pmda.go.jp/>
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店
又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334
受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ www.kracie.co.jp

発売元 **クラシエ薬品株式会社**
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元 **クラシエ株式会社**
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

“Kracie” Kampo

Mashinganryo Extract Tablets (96 tablets)

For people with constipation who are unable to have smooth bowel movements due to having hard stool

Ingredients

The daily dose of 12 tablets (303 mg/tablet) contains 1,800 mg of Mashinganryo extract powder from the following mixed crude drugs;

Hemp Fruit 2.2 g, Peony Root 1.1 g, Immature Orange 1.1 g, Magnolia Bark 1.1 g, Rhubarb 1.925 g, Apricot Kernel 1.375 g.

As inactive ingredients, this medicine contains Magnesium Stearate, Aluminum Silicate, Carmellose Calcium, Cellulose, Hypromellose, Hypromellose Phthalate, Macrogol, Triacetine, Ferric Oxide, and Blue No. 2.

Indications

Following symptoms in persons with moderate or poor physical strength who experience hard and lumpy stool sometimes: Constipation, heavy head, hot flashes, eczema/dermatitis, pimples (acne), loss of appetite (anorexia), fullness of abdomen, abnormal fermentation in the intestines, and hemorrhoids associated with constipation.

Dosage and administration

Take the following dosages 3 times a day with water or warm water before or between meals.

Adults (15 years and over) - 4 tablets

Less than 15 years - Do not use

Precautions for use

When not to use the product

(If you do not follow these instructions, the current symptoms may worsen or adverse reactions are more likely to occur.)

1. This medicine should not be taken together with the following medicines:

Other cathartic agents.

2. Nursing women should either not take this medicine or stop nursing while taking this medicine.

Consultation

1. The following persons should contact a physician, pharmacist, or registered salesperson for a consultation before administration.

(1) Patients undergoing medical treatment from a physician.

(2) Pregnant women or women suspected of being pregnant.

(3) Persons with weak stomach and intestine who have a tendency to diarrhea, diarrhea with severe abdominal pain.

2. If the following symptoms are observed after taking this drug, these may be adverse reactions, so immediately discontinue the use of this drug, and show this document to your physician, pharmacist, or registered salesperson for a consultation.

Affected areas: Symptoms

Gastrointestinal system: Diarrhea with severe abdominal pain, abdominal pain

3. The following symptoms may be observed after taking this drug. If these symptoms persist or worsen, discontinue the use of this drug, and show this document to your physician, pharmacist, or registered salesperson for a consultation.

Diarrhea

4. When symptoms do not improve even after taking the medicine for 5 to 6 days, stop taking this medicine and consult a physician, pharmacist or registered salesperson, being sure to take this instruction leaflet with you.