

Please be sure to read this package insert before use. Also, keep it carefully stored so you can refer to it when necessary.

Class 2 drugs

◆Uchida Chinese herbal preparations◆

Uchida Yokukansankachenpihange extract powder

Uchida's Yokukansanka Chinpei Hange Extract powder is a water extract obtained by blending and extracting herbal medicines according to Chinese herbal prescriptions, and it is processed into fine granules for easy consumption.

Precautions for use

If you do not adhere to these guidelines, your current symptoms may worsen, or side effects may occur more easily. Do not administer this product to infants under 3 months old.

1. The following people should consult a doctor, pharmacist before taking the drug.

- (1) A person receiving treatment from a doctor.
- (2) Pregnant women or people who appear to be pregnant.
- (3) People with weak stomachs and intestines.
- (4) Persons who have ever experienced rash, redness, itching, etc. due to medicines, etc.

2. If the following symptoms appear after taking this medicine, it may be a side effect, so stop taking it immediately and consult your doctor or pharmacist with this document.

Related parts	symptoms
Skin	Rash/redness, itching

3. About 1 month (about 1 week if taken for pediatric night crying) If your symptoms do not improve even after taking this medicine, discontinue use and consult your doctor, pharmacist, or registered salesperson with this document.

Ingredients/Amount

Daily amount (7.5g) of this product

Yokukansankachenpihange Extract... 3.15g including:

Hange	2.5g
Atractylodes Rhizome	2.0g
PoriaSclerotium	2.0g
Cnidium Rhizome	1.5g
CitrusUnshiuPeel	1.5g
Japanese Angelica Root	1.5g
Bupleurum Root	1.0g
Glycyrrhiza	0.75g
Uncaria Hook	1.5g

Contains lactose hydrate and potato starch as excipients, and Mg aluminate metasilicate as an anti-hygroscopic agent.

Precautions for storage and handling

- (1) Store tightly closed in a cool, dry place away from direct sunlight.
- (2) Store out of reach of children.
- (3) Do not transfer to another container. (This may cause misuse or change the quality.)

●Contact information

For inquiries regarding the contents of this product, please contact the store where you purchased it or the information below.

Uchida Wakanyaku Co., Ltd. Customer
consultation center TEL 03-3806-4141
Reception hours 9:00-17:30 (excluding Saturdays,
Sundays, and holidays)

Efficacy/Effect: Given a moderate level of physical strength, you may experience a slightly weakened digestive system, nervousness, easy anger, or irritability, along with the following symptoms: Neurosis, insomnia, nocturnal crying in children, pediatric enuresis (nervousness), menopause, blood path syndrome.

(Note: "Blood path syndrome" refers to neuropsychiatric symptoms and physical symptoms such as mental anxiety and irritability that occur due to hormonal fluctuations during menstruation, pregnancy, childbirth, postpartum, and menopause.)

Usage/Dosage


Take the following dose three times a day before or between meals.

age	1 time amount
Adult (15 years and older)	2.5g
Under 15 years old 7 years old or older	2/3 of adult amount
Under 7 years old 4 years old or older	1/2 the amount for an adult
Under 4 years old 2 years old or older	1/3 of adult amount
Under 2 years old	Less than 1/4 of the adult amount

<Precautions related to usage/dosage>

- (1) One serving of the attached teaspoon is approximately 1g.
- (2) When administering this drug to children, it should be administered under the guidance and supervision of their parents.
- (3) For infants under 1 year old, priority should be given to medical treatment by a doctor.

Due to the use of natural ingredients, the color of this medication may vary slightly between products, but its efficacy and effectiveness will remain consistent. Nonetheless, it should only be administered when absolutely necessary.


Uchida Wakanyaku
Co., Ltd.
 * 1755-3 Kumegaike, Ogata Ward,
 Joetsu City, Niigata Prefecture

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

◆ウチダの漢方製剤◆

ウチダの 抑肝散加陳皮半夏 エキス散

ヨクカンサンカチンピハンゲ

ウチダの抑肝散加陳皮半夏エキス散は、漢方処方にしたいがい生薬を配合し抽出して得た水製エキスを服用しやすく細粒としたものです。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸の弱い人。
- (4) 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位(小児夜泣きに服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分・分量

本品1日量(7.5g)中

抑肝散加陳皮半夏エキス……………3.15g

ハンゲ……………	2.5g
ビャクジュツ……………	2.0g
ブクリョウ……………	2.0g
センキュウ……………	1.5g
テンピ……………	1.5g
トウキ……………	1.5g
サイコ……………	1.0g
カンゾウ……………	0.75g
チョウトウコウ……………	1.5g

賦形剤として乳糖水和物・バレイシヨデンプン、吸湿防止剤としてメタケイ酸アルミン酸Mgを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

TEL 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

効能・効果

体力中等度をめやすとして、やや消化器が弱く、神経がたかぶり、怒りやすい、イライラなどがあるものの次の諸症：
神経症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症(神経過敏)、更年期障害、血の道症^{注)}、歯ぎしり

〈効能・効果に関連する注意〉

注)「^{ちのみちしょう}血の道症」とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

用法・用量

次の1回量を1日3回食前または食間に服用する。

年齢	1回量
大人(15歳以上)	2.5g
15歳未満7歳以上	大人の2/3の量
7歳未満4歳以上	大人の1/2の量
4歳未満2歳以上	大人の1/3の量
2歳未満	大人の1/4以下の量

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 添付のサジ1ばいが約1gです。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合のみ服用させること。

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

* 新潟県上越市大湯区蜘蛛池 1755-3