

FOLIAR PACK!

OG BIOWAR FOLIAR PACK INSTRUCCIONES

El [FOLIAR PACK](#) de OG Biowar está compuesto por microbios beneficiosos y un portador de talco de grado farmacéutico. Eso puede usarse de dos maneras, mezclarse con agua o aplicarse directamente incorporándose a su mezcla suelo, sustrato o mezcla de fibra de coco. Es importante seguir las instrucciones de mezcla a continuación.

Instrucciones de mezcla para riego:

- 1) Mezcle 1 cucharadita del PAQUETE FOLIAR por cada litro de agua SIN CLORO.
- 2) Mezcle bien, separando todos los grumos para que la solución se vea agradable, homogénea y turbia.
- 3) Deje que la solución se asiente durante 3-5 minutos. El portador de talco se asentará lentamente en el fondo, pero los microbios permanecerán suspendidos en el agua.
- 4) Vierta o saque el líquido de la parte superior, evitando que la mayoría del portador de talco se lave del fondo. El portador de talco es seguro, así que no te preocupes por tocar un poco las plantas o el suelo. Sin embargo, es mejor evitar esto en su mayoría, ya que a veces el portador de talco puede obstruir los rociadores y hacer que el suelo se drene lentamente. Cuando haya terminado, enjuague el portador de talco del recipiente de mezcla.

Como tratamiento de plántulas: 1 cucharada por cada litro de agua SIN CLORO antes de plantar.

Para esquejes o brotes por plantar: 1 cucharadita por cada litro de solución antes de colocar el corte.

Riego para plantas enraizadas: 1 cucharadita por litro de agua SIN CLORO hasta que esté escurriendo.

Como rociador foliar: La solución se puede utilizar para rociar todas las superficies de plantas y macetas.

¡Asegúrese de rociar cada rincón, hoja y rama de la planta!

!!!IMPORTANTE!!!: LEE ABAJO



FOLIAR PACK!

CUANDO ESTÉ ROCIANDO LAS PLANTAS SE RECOMIENDA APAGAR LAS LUCES, APAGUE LA CALEFACCIÓN, LOS VENTILADORES POR 2 HORAS. ¡ESTE PAQUETE FUNCIONA MEJOR CUANDO LA HUMEDAD ES ALTA!

Instrucciones para mezclar directo (seco): Agregue 1 cucharadita por cada galón de mezcla.
Ejemplo: una olla de 5 galones mezcle 5 cucharaditas.

¡Eso es! Es mejor mezclarlo en seco cuando se trasplanta a contenedores nuevos.

