

CORECUMIN®

25 ML

	Hoeveelheid Per Portie	% Dagelijkse Hoeveelheid
Vitamine D3	2.4 mcg	12%
Vitamine B12	0.6 mcg	26%
Jodium	11 mcg	7%
Kalium	9 mg	0%
Kurkomawortelextract	15 mg	*
Curcumine	12.8 mg	*
Demethoxycurcumine	0.5 mg	*
Bisdemethoxycurcumine	0.3 mg	*
<i>* Dagelijkse hoeveelheid niet vastgesteld</i>		

Andere ingrediënten: gedeïoniseerd water, glycerol, erythritol, xylitol, organische dextrose, organische zonnebloemlecithine, beta-cycloamylose, organische Arabische gom en natrium hydroxide.

Dit product is vrij van gluten, zuivel, tarwe, soja, gist, eieren, vis, schelpdieren, boomnoten, pinda's, kunstmatige smaakstoffen, kleuren, zoetstoffen en conserveringsmiddelen.

Aanbevolen gebruik: Portiegrootte op basis van lichaamsgewicht en voeg de gesuggereerd aantal druppels toe in een glas water. Drink bij voorkeur 30 minuten voor of na een maaltijd, of zoals anders voorgeschreven door uw arts of apotheker. Verspreid de inname over de dag voor maximale biologische beschikbaarheid. Niet innemen met zure voedingsmiddelen, koolzuurhoudende dranken, vruchtensappen of medicijnen.

Hoeveelheid per lichaamsgewicht:

Gewicht in kilo's	Druppels per portie	Porties per dag	Druppels per dag	Totaal curcuminoïde (mg) per dag	Aantal porties per fles
14 - 34	1	1	1	4	751
35 - 45	2	2	4	15	375
46 - 68	3	3	9	34	250
69 - 90	4	3	12	45	188
91 - 113	6	3	18	68	125
114 - 136	7	3	21	79	107
137+	8	3	24	90	94

Contra-Indicaties: Galwegobstructies, galstenen, obstructieve icterus en acute galkoliek. In hoge dosering kan curcumine leiden tot nierstenen bij mensen die daar gevoelig voor zijn. Over het gebruik bij zwangerschap en lactatie zijn onvoldoende gegevens bekend en dit wordt daarom afgeraden.

Mogelijke bijwerkingen: Misselijkheid, uitslag, slechte spijsvertering en diarree. Te hoge doseringen kunnen aanleiding geven tot prikkeling van het maagslijmvlies en dienen vermeden te worden door patiënten met een maag- of darmzweer. Ook kunnen er bij gebruik in hogere dosering buikklachten ontstaan als misselijkheid en diarree en kan de frequentie van de ontlasting toenemen. Stop het gebruik als u bijwerkingen ervaart.

Mogelijke reacties: De kans op blauwe plekken en bloedingen worden vergroot als u Curcumine inneemt in combinatie met medicijnen die de bloedstolling vertragen. Medicijnen die de bloedstolling vertragen zijn bijvoorbeeld aspirine, clopidogrel (Plavix®), diclofenac (Voltaren®, Cataam® en anderen), ibuprofen (Advil®, Motrin® en andere winkelmerken), naproxen (Anaprox® en Naprosyn®), dalteparine (Fragmin®), enoxaparine (Lovenox®), heparine, warfarine (Coumadin®), apixaban (Eliquis®) en rivaroxaban (Xarelto®). Antidepressiva zoals, sertraline (Zolof®), fluoxetine (Prozac® en Sarafem®), citalopram (Celexa®), escitalopram (Lexapro®), paroxetine (Paxil®, Peveva® en Brisdelle®), fluvoxamine (Luvox®) en anderen.

Bewaardvies: Uit zonlicht in een donkere kast op kamertemperatuur bewaren.

Let op: Raadpleeg, net als bij elk voedingsmiddel, uw arts professional voor gebruik, vooral als u medicijnen gebruikt, een medische aandoening of bekende bijwerkingen of allergieën hebt. Vermijd het gebruik van dit product als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Curcumine interfereert met bloedstolling en kan de neurotransmitterfunctie beïnvloeden. Het kan extra bloedingen veroorzaken tijdens en na de operatie. Raadpleeg uw arts voor gebruik, als u antistollingsmiddelen of antidepressiva gebruikt, of als u hebt gepland om een operatie te ondergaan.

ADVANCARE