

DAOSiN®

Maisto papildas su diamino oksidazės (DAO) fermentu.

Palaiko histamino, gauto su maistu, įsisavinimą žarnyne.

Papildo organizme esantį DAO fermentą histamino skaidymui.

10 kapsulių.

Grynasis kiekis 2,54 g.

Sudedamosios dalys: stabilizatorius mikrokristalinė celiuliozė, kapsulės apvalkalas hidroksipropilmetilceliuliozė, sacharozė, L-askorbo rūgštis (vitaminas C), ryžių krakmolai, glazūros medžiaga šelakas, stabilizatorius hidroksipropilceliuliozė, baltymų ekstraktas iš kiaulių inkstų (0,1 % diamino oksidazės), užpildas polivinilpolipirolidonas, lipumą reguliuojančios medžiagos: talkas, modifikuotas krakmolai; tirštiklis natrio karboksietilceliuliozė, drėgmę išlaikanti medžiaga glicerolis.

Vartojimas. Vartoti po 1 kapsulę su trupučiu vandens 15 minučių prieš vartojant histamino turinčio valgio. Didžiausia paros dozė yra 3 kapsulės (kai valgoma 3 kartus histamino turinčių valgių per dieną). Kapsulės turinys negali būti kramtomas prieš rijimą, jį reikia nuryti visą, kad turinys galėtų prasiskverbti pro skrandį ir nepakitęs pasiekti žarnyną. Jei turite sunkumų praryti kapsulę, galite ją atidaryti ir jos turinį nekramtant praryti, užgeriant trupučiu vandeniu. Nesmulkinkite ir nekramtykite.

Neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės.

Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Saugoti produktą nuo šilumos.

Geriausias iki ... (pabaigos)/ Partijos Nr: žr. ant pakuotės.

Gamintojas: „SCIOTEC Diagnostic Technologies GmbH“, Ziegelfeldstraße 3, A-3430 Tulnas, Austrija.

Platintojas: UAB „STADA-Nizhpharm-Baltija“, A. Goštauto g. 40A, LT-03163 Vilnius, Lietuva.

Mitybinė vertė	100 g	1 kapsulėje*	3 kapsulėse**
Energinė vertė	220 kJ/53 kcal	< 1 kJ/ < 1 kcal	< 1 kJ/ < 1 kcal
Riebalai	< 0,1 g	<0,1 mg	<0,1 mg
kuriuose: sočiųjų riebalų rūgščių	0 g	0 mg	0 mg
Angliavandeniai	11 g	29 mg	87mg
kuriuose cukrų	6,3 g	16 mg	48 mg
Baltymai	1,7 g	4,2 mg	12,6 mg
Druska	0 g	0 mg	0 mg
Baltymų ekstraktas iš kiaulių inkstų,	1,7 g	4,2 mg	12,6 mg
kuriuose diamino oksidazės	0,1 g	0,3 mg	0,9 mg

* Atitinka rekomenduojamą suvartojimą vienam histamino turinčiam valgiui.

** Atitinka didžiausią rekomenduojamą paros dozę trimis histamino turintiems valgiams.