

DH-Complex 50 mg en 100 mg capsules

Algemeen

Dit geneesmiddel is receptplichtig.

Bewaar DH-Complex beneden 25 °C. Houd het medicijn buiten het bereik en uit het zicht van kinderen.

Samenstelling

1 capsule DH-Complex 50 mg bevat 50 mg prasteron (dehydroepiandrosteron, DHEA) en de volgende voedingssupplementen: dimethylaminoethanol 10 mg, dimethylglycine 5 mg, glutathion 5 mg, quercetine 5 mg en co-enzym Q10 2,5 mg.

1 capsule DH-Complex 100 mg bevat 100 mg prasteron (dehydroepiandrosteron, DHEA) en de volgende voedingssupplementen: dimethylaminoethanol 20 mg, dimethylglycine 10 mg, glutathion 10 mg, quercetine 10 mg en co-enzym Q10 5 mg.

Toepassing

DH-Complex wordt voorgeschreven ter voorkoming van verouderingsverschijnselen.

Prasteron wordt door de bijnierschors gemaakt, op jongere (20-30 jarige) leeftijd is het in grotere hoeveelheden in het lichaam aanwezig dan op oudere leeftijd (vanaf 40 jaar). Het mogelijk tekort van prasteron wordt door een aantal wetenschappers en artsen als oorzaak van bepaalde ziektebeelden beschouwd. De voedingssupplementen ondersteunen de werking van prasteron.

Gebruik

Kijk voor het juiste gebruik altijd op het etiket van de apotheek.

Tenzij uw arts anders voorschrijft, is de dosering 1 tot 15 capsules per dag (50 mg tot 1500 mg prasteron per dag).

Tijdens de behandeling zal de behandelend arts één of meer bloedbepalingen doen om de bloedspiegel van DHEA en andere aanverwante hormonen te controleren.

Wanneer u te veel heeft ingenomen, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts.

Gebruik DH-Complex zo lang als uw arts voorschrijft. U kunt zonder problemen in één keer stoppen.

Contra-indicaties

Overgevoeligheid of allergie voor één van de bestanddelen, leverfunctiestoornissen, (een geschiedenis van) hormoongevoelige tumoren. Leeftijd jonger dan 30 jaar, omdat de lichaamseigen productie wordt onderdrukt. Voorzichtig bij oedeem, epilepsie en migraine, omdat dit kan verergeren door vochtretentie.

Prasteron is vermeld op de WADA-dopinglijst.

Interacties

Prasteron versterkt de werking van cumarinederivaten. Meld het starten en stoppen van DH-Complex altijd aan de trombosedienst of aan de eigen apotheek.

Quercetine kan de werking van everolimus verminderen. Overleg met uw arts.

De werking van topotecan kan door quercetine toenemen. Overleg met uw arts.

Zwangerschap, borstvoeding en kindervens

Niet gebruiken bij zwangerschap en het geven van borstvoeding.

Bijwerkingen

Frequentie onbekend: Bij vrouwen acne, haaruitval, mannelijke haargroei, stemverlaging. Ook bij mannen afwijkende leverfunctiewaarden, toegenomen libido, vasthouden van vocht, verhoogde insulinegevoeligheid, stijging van hemoglobinegehalte, stemmingswisselingen, hoofdpijn, gevoelsstoornis.

Als u vermoedt dat u een bijwerking hebt gekregen die niet in deze bijsluiter staat, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts. Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Aan deze informatieve tekst, die weergeeft wat er in de apotheek over DH-Complex bekend is, kunnen geen rechten of plichten worden ontleend.