



PECUARIA

CLIMA FRÍO



## AVENA CAYUSE AVENA IMPORTADA

FORRAJES

- Buena producción de forraje, pero con alta susceptibilidad a la Roya, su ciclo vegetativo es intermedio.

Nombre científico	<i>Avena sativa</i>
Densidad de siembra sola (voleo)	150 lb/ha
Densidad de siembra en mezcla con Vicia Atropurpurea (voleo)	125 lb/ha
Adaptación (metros sobre el nivel del mar)	2200 - 3200 msnm
Días a germinación	5 - 7
Tiempo en días a la cosecha (rango promedio) (grano entre lechoso - pastoso) (*)	120 - 140
Rango de pH	5,0 - 8,0
Precipitación en milímetros mes	75 - 90
Tolerancia a Roya ( <i>Puccinia spp.</i> )	Baja
Producción de forraje verde al corte en toneladas por hectárea (*)	45 - 65
Proteína Cruda (PC) (%) (*) (**)	8 - 12
Fibra en Detergente Neutro (FDN) (%) (*) (**)	48 - 65
Fibra en Detergente Ácido (FDA) (%) (*) (**)	26 - 45

(\*) El tiempo en días a la cosecha, la producción y calidad nutricional del forraje, dependerán de las condiciones edafo-climáticas y de manejo (fertilización, riego, etc.).

(\*\*) Rango promedio como porcentaje de la materia seca.

\*NOTA: La información contenida en esta ficha técnica, es producto de evaluaciones realizadas por Sáenz Fety S.A.S. y puede variar de acuerdo con las condiciones agroecológicas y/o de manejo propias de cada zona.