



PECUARIA

CLIMA FRÍO



# TETRA BLEND® ITALIANO

Mezcla

FORRAJES

- Buena rusticidad y alta producción de forraje comparada con otros Ryegrasses Italianos del mercado.

(\*) El tiempo al primer pastoreo o corte, los días a la cosecha, el tiempo de rotación o cortes, la producción y calidad nutricional del forraje, dependerán de las condiciones edafo-climáticas y de manejo (fertilización, riego, etc.)

(\*\*) Rango promedio como porcentaje de la materia seca.

Composición	Ryegrass Anual Diploide 1: 70%
	Ryegrass Anual Diploide 2: 15%
	Ryegrass Anual Diploide 3: 15%
Densidad de siembra	75 - 100 lb/ha
Adaptación (metros sobre el nivel del mar)	2200 - 3300 msnm
Días a germinación	5 - 7
Tiempo al primer pastoreo o corte en días (rango promedio) - Prefloración (antes de espigar) (*)	65 - 90
Tiempo de rotación en días (rango promedio) - Prefloración (antes de espigar) (*)	28 - 40
Rango de pH	5,0 - 8,0
Precipitación en milímetros mes	90 - 100
Tolerancia a Roya ( <i>Puccinia spp.</i> )	Media
Producción de forraje verde por corte o pastoreo en toneladas por hectárea (*)	16 - 20
Proteína Cruda (PC) (%) (*) (**)	14 - 20
Fibra en Detergente Neutro (FDN) (%) (*) (**)	45 - 53
Fibra en Detergente Ácido (FDA) (%) (*) (**)	25 - 35
Energía Neta de Lactancia (Mcal/kg) (*) (**)	1,2 - 1,3

\*NOTA: La información contenida en esta ficha técnica, es producto de evaluaciones realizadas por Sáenz Fety S.A.S. y puede variar de acuerdo con las condiciones agroecológicas y/o de manejo propias de cada zona.

Versión 2.0 - Fecha de Publicación: 2019, Mayo.