



Calendrier des semis

	Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Septembre ¹				Octobre ²				Note
Semaine	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Aubergine																																	
Basilic et fines herbes																																	
Bette à Carde																																	
Betterave																																	
Calendulas																																	
Camomille																																	Pour une production plus hâtive en saison.
Capucines																																	
Carotte																																	Dès que le sol peut être travaillé.
Choux Chinois, Choux pommé																																	Semis extérieur dès que le sol peut être travaillé.
Choux Kale																																	Semis extérieur dès que le sol peut être travaillé.
Ciboulette																																	
Citrouilles, courges, cougettes																																	Pour une production plus hâtive en saison.
Concombres																																	Pour une production plus hâtive en saison.
Cosmos																																	Pour une production plus hâtive en saison.
Épinard																																	Semer des rangs en alternance aux 2 semaines. Semis extérieur dès que le sol peut être travaillé.
Gourganès																																	Semis extérieur dès que le sol peut être travaillé.
Haricots Grimpants, nains et secs																																	Semer des rangs à une semaine d'intervalle.

Légende :

- Semis intérieur
- Semis directement extérieur
- Transplantation au jardin
- Commencer à acclimater les plants dehors*
- Culture au jardin

**Sortir les plants à l'extérieur en commençant par de courtes expositions, en augmentant la durée de jour en jour (30 min., 1 hr., 2hrs., jusqu'à 8hrs) afin de les acclimater aux éléments extérieurs (soleil, vent, température) Rentrer les plants à l'abri (serre ou maison) durant la nuit. Débuter par une journée nuageuse et sans vent. Ou une faible exposition au soleil (30 min. + aucun vent).*

¹ Attention! Risque de gel nocturne en septembre.
² Récolter et protéger les crucifères et les légumes feuilles la nuit au besoin en octobre.



Calendrier des semis suite...

	Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Septembre				Octobre				Culture				
Semaine	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Laitue																																					Dès que le sol peut être travaillé. Pour une récolte automnale semer à nouveau fin août.
Maïs																																					
Navet, rutabagas, rabioles																																					Dès que le sol peut-être travaillé.
Oignons, poireaux, échalottes																																					Semis intérieur dès 2e semaine de février.
Panais,																																					
Piments et poivrons																																					
Pois																																					Semer des rangs en alternance aux 2 semaines dès que le sol peut être travaillé.
Radis																																					Semer des rangs en alternance aux 2 semaines.
Roquette																																					Semer des rangs en alternance aux 2 semaines.
Rose Trémière																																					Pour une production plus hâtive en saison.
Tomates																																					Pour les tomates hâtives semer durant la troisième et quatrième semaine d'avril. Pour les plus tardives (80 jours et plus) : semis début avril max.
Tournesol																																					
Patates et oignons en bulbe																																					

Légende :

-  Semis intérieur
-  Semis directement extérieur
-  Transplantation au jardin
-  Commencer à acclimater les plants dehors
-  Culture au jardin



Astuce pour la plantation des tomates au jardin :

Si vos plants de tomates sont très longs, enlevez quelques feuilles à la base de la tige et enterrez une partie de la tige à l'horizontale lors de la plantation.

Ce calendrier est spécifiquement adapté à la région du Bas-St-Laurent. Les semaines estimées peuvent varier selon votre région; de 1-3 semaine à l'avance avec les régions à l'ouest ou plus au sud (Québec, Témiscouata) et jusqu'à 1-2 semaine plus tard avec les régions plus nord et à l'est (Gaspésie, Côte-Nord). Évidemment, si vous cultiver en serre il faudra l'adapter puisque vous devez devancer la saison de culture. Enfin, ceci est la compilation de mes notes issues de mes observations et procédés personnels et ne peut en aucun cas servir de garantie quelconque.