

アレルギー用薬

この説明書は本剤とともに保管し、服用に際しては必ずお読みください。

アレルギー用剤3号

アレルギー用剤3号は、クロルフェニラミンマレイン酸塩を主薬とし、3種のビタミンとリン酸水素カルシウム水和物を配合した、湿疹、かぶれ、じんましんや鼻炎等に効く内服薬です。

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他のアレルギー用薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬等）
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります。)
3. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 次の症状のある人。
排尿困難
(5) 次の診断を受けた人。
緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 泌尿器 | 排尿困難 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|---------|--|
| 再生不良性貧血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。 |
| 無顆粒球症 | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
口のかわき、眠気
4. 5～6日間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

効能・効果

湿疹・かぶれによるかゆみ、じんましん、鼻炎

成分と作用

4.5g（大人1日量）中に次の成分を含んでいます。

| 成 分 | 4.5g 中 | 作 用 |
|---------------------|--------|-------------------|
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 0.012g | アレルギー症状をおさえます。 |
| リボフラビン | 0.012g | 皮膚のアレルギー疾患を緩和します。 |
| ピリドキシン塩酸塩 | 0.05g | |
| パントテン酸カルシウム | 0.03g | 賦形剤。 |
| リン酸水素カルシウム水和物 | 2.896g | |
| デンプン、乳糖水和物又はこれらの混合物 | 適 量 | 賦形剤。 |

<成分・分量に関連する注意>

本剤の服用により、尿が黄色になることがあります。また、臨床検査値に影響を与えることがあります。

用法・用量

1回量を次のとおりとし、1日3回、食後に服用します。

| 年 齢 | 1 回量 | 1 日服用回数 |
|-------------|---------|---------|
| 大人（15才以上） | 1包 1.5g | 3 回 |
| 11才以上 15才未満 | 大人の2/3 | |
| 7才以上 11才未満 | 大人の1/2 | |
| 3才以上 7才未満 | 大人の1/3 | |
| 1才以上 3才未満 | 大人の1/4 | |
| 1才未満の乳児 | 服用しないこと | |

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- (4) 1包の分割した残りを服用する場合には、残量を記載して保管し、2日以内に服用してください。

■お問い合わせ先

薬局セブンファーマシー 本店 0742-71-4783

■製造販売元

有限会社セブンプロジェクト

TEL 0742-71-9501 FAX 0742-71-9529

【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】

注意

1. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
2. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 次の症状のある人。
排尿困難
 - (5) 次の診断を受けた人。
緑内障
- 2'. 服用が適さない場合があるので、服用前に医師又は薬剤師に相談してください
〔2. の項目の記載に際し、十分な記載スペースがない場合には2' . を記載すること。〕
3. 服用に際しては、説明文書をよく読んでください
4. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください
5. 小児の手の届かない所に保管してください
6. その他
 - (1) 医薬品副作用被害救済制度に関するお問い合わせ先
（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）
 - (2) この薬に関するお問い合わせ先
薬局セブンファーマシー 本店
受付時間：9時00分から20時00分まで（但し土曜日は15：00まで、日曜日、祝日は除く）
電話：0742-71-4783
F A X：0742-71-6388