

A・E・P軟膏

A・E・P軟膏は、粘膜の異常乾燥、角化改善作用を持つパルミチン酸レチノールに末梢循環障害を改善する酢酸トコフェロールをゲル化炭化水素に練合した軟膏で、ひじ・ひざ・かかとのあれ、指先・手のひらのあれ、ひび、しもやけ、あかぎれ等に用いる外用薬です。

相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 湿潤やただれのひどい人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

効能・効果

ひじ・ひざ・かかとのあれ、指先・手のひらのあれ
ひび、しもやけ、あかぎれ

成分と作用

100g中に次の成分を含んでいます。

成 分	100g中	作 用
パルミチン酸レチノール（ビタミンAとして1g中150万I. U.含有）	0.067g	粘膜の異常乾燥・角化を改善します。
酢酸トコフェロール	0.5g	末梢循環改善作用を発揮します。
ゲル化炭化水素	適 量	基剤。

用法・用量

適宜、患部に塗布します。

<用法・用量に関連する注意>

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）

■お問い合わせ先

薬局セブンファーマシー 本店
有限会社セブンプロジェクト
0742-71-9501
製造販売元
薬局セブンファーマシー本店

【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】**注意**

- 使用に際しては、説明文書をよく読んでください。
- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。