

## MC BROTAMIX MAGNESIO

Abono a base de aminoácidos libres obtenidos por hidrólisis de proteínas de origen animal y magnesio, en forma de sales de Epsom (sales de sulfato de magnesio).

Fertilizante de alta eficacia y rápida absorción al aplicar de forma conjunta aminoácidos y Magnesio.

Especialmente indicado cuando se necesita una elevada demanda de Magnesio en el cultivo.

### Composición (% p/p)

Óxido de Magnesio (MgO): 6.00%; Aminoácidos libres: 4.19%; Nitrógeno (N) Total: 0.68%; Materia Orgánica total: 4.59%;

Peso específico 1.05-1.10 Kg/L

pH: 6.0-6.2

### Aminograma (p/p)

**Contenido en aminoácidos totales:** Ácido Aspártico 0.36%; Ácido Glutámico 0.53%; Alanina 0.24%; Arginina 0.35%; Cisteína 0.17%; Fenilalanina 0.24%; Glicina 0.36%; Hidroxiprolina 0.61%; Isoleucina 0.24%; Histidina 0.05%; Leucina 0.40%; Lisina 0.18%; Metionina  $l_q < 0.1\%$ ; Prolina 0.44%; Serina 0.57%; Tirosina  $l_q < 0.1\%$ ; Treonina 0.27%; Triptófano  $< 0.1\%$ ; Valina 0.31%.

**Contenido en aminoácidos libres:** Ácido Aspártico 0.35%; Ácido Glutámico 0.48%; Alanina 0.22%; Arginina 0.30%; Cisteína 0.15%; Fenilalanina 0.21%; Glicina 0.33%; Hidroxiprolina  $l_q < 0.1\%$ ; Isoleucina 0.18%; Histidina  $l_q < 0.1\%$ ; Leucina 0.37%; Lisina 0.18%; Metionina  $l_q < 0.1\%$ ; Prolina 0.39%; Serina 0.56%; Tirosina  $l_q < 0.1\%$ ; Treonina 0.23%; Triptófano  $l_q < 0.1\%$ ; Valina 0.24%.

La empresa declara que ninguna de las materias primas utilizadas en la elaboración de este producto procede de un OGM.

### Nº de Registro

n.p.

### Formulación

Líquido soluble

## Presentación

Envases: 1-5-20-200-1000 LITROS

## Forma de Actuación

Está especialmente indicado cuando se necesite una rápida demanda de Magnesio en el cultivo.

En agricultura ecológica, NO APLICAR en las partes comestibles del cultivo.

## Dosis

Aplicación foliar: utilizar entre 200-400 ml/hl, según cultivo.

Aplicación radicular: de 5 a 8 l/Ha, recomendando de 4 a 6 aplicaciones durante el ciclo vegetativo.

## Plazos de Seguridad

No procede.

## Precauciones y Recomendaciones

No almacenar a más de 35°C, ni apilar a más de 4 alturas.

Agitar antes de usar y no tirar el envase en el ambiente.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Mantener el producto en su envase original.

En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua.

Se recomienda realizar siempre una prueba previa de mezcla y de compatibilidad con el cultivo.

En caso de duda consultar al servicio técnico: [stecnico@mcbiofertilizantes.com](mailto:stecnico@mcbiofertilizantes.com)

## Toxicología

No se conocen problemas toxicológicos derivados del uso del producto.

**Producto utilizable en Agricultura Ecológica con forme al Reglamento (CE) Nº 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, posteriores modificaciones y ampliaciones con CERTIFICACIÓN SOHISCERT Nº AN83PAE.**