

EQUUS ÉLITE

PIENSO FUNCIONAL Y NUTRACÉTICO



Con propiedades antiinflamatorias, antioxidantes e inmunitarias

Óptimo balance de w3-w6-w9 y prebióticos, para mejorar absorción intestinal, salud y vitalidad.

DESCRIPCIÓN

Pienso especialmente diseñado para satisfacer las elevadas necesidades proteicas, vitamínicas y óseas, de potros de crecimiento precoz; para yeguas de gestación avanzada o en lactación, así como para caballos tal cual o mezclado con avena al 50%.

Incorpora un suplemento de minerales, proteína digestible, aceites y 10 vitaminas entre ellas Vitamina H (Biotina) para fortalecer los cascos. Contenido potencial máximo de OMG:

22%.

INGREDIENTES

Tercerillas y salvado de trigo, cebada y avena tratada térmicamente, gluten de maíz, salvado grano de arroz, germen de maíz, germen de garrofin, raicilla de germinados de cebada, harina de soja, pulpa blanca, aceites vegetales, clinoptilolita, levadura inactivada, aceites esenciales, minerales y oligoelementos

COMPONENTES ANALÍTICOS

PROTEINA BRUTA.....	15%
ACEITES Y GRASAS BRUTAS.....	6%
CENIZAS BRUTAS.....	7.5%
FIBRA BRUTA.....	9.3 %
SODIO.....	0.22%

USOS Y ADMINISTRACIÓN

Para potros: Desde 3 a 30 meses: Administrar de 0,5 a 4 kg por animal y día. Consumo por día y hasta los 18 meses, 200 gramos diarios por mes de vida. (Potro con 10 meses : 2 kg; con 15meses:3 kg). A partir de esta edad hasta los 30 meses, mantener esta cantidad y después la dosis de un caballo adulto. El potro empezará a comer pienso de la ración de la madre a partir de los 20 días de vida, y esto favorece destete precoz.

Para yeguas lactantes: Entre 2 y 5 kilos /día dependiendo de edad y condición corporal de la yegua y cria, así como de la disponibilidad de pasto y/o mes de lactación. Como referencia para yeguas con potro de 3 meses unos 5.5 kilos

Para caballos: De 3.5 a 4 kg al día. Medio kg más por cada hora de actividad diaria Como concentrado: Utilizar al 50% con avena y administrar según las dosis recomendadas anteriormente.

En todos los casos suplementar con paja o forraje de buena calidad (al menos el 1% del peso vivo) y agua potable. Se debe incorporar esta dieta diaria, repartida en dos o tres tomas, fraccionándola proporcionalmente.

Utilícese preferentemente antes de los 6 meses siguientes, a la fecha de fabricación.