

FICHA TÉCNICA
APOSITO CON FORMULA GEL CONTROLADA DuoDERM® CGF® EXTRA THIN
PROVEEDOR: BOSTON MEDICAL DEVICE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

PRODUCTO	
Nombre genérico	Apósito Hidrocoloide
Nombre comercial	DuoDERM® CGF® Extra Thin Apósito Hidrocoloide.
Descripción	Apósito oclusivo hidrocoloide.
Registro sanitario	0229C2013 SSA
Uso	Ulceras dérmicas y heridas superficiales, secas a ligeramente exudativas, heridas postquirúrgicas, apósitos protectores como en áreas sujetas a fricción o que requieran contorsión como rodillo y cotobelo.
Presentaciones	187961 - 5x20 cm (Cj x10) 187955 - 10x10 cm (Cj x10) 187901 - 7.5x7.5 cm (Cj 20)
Composición del producto	Sustancias Hidrocoloideas: Carboximetil Celulosa Sódica – Pectina USP- Gelatina. Soporte: Espuma / Película Laminada en Poliuretano.
Marca	ConvaTec.
Fabricante	ConvaTec Inc.
Características y acciones del producto	Oclusivo: DuoDERM CGF Extra Delgado es impermeable a los líquidos, los gases y los microorganismos incluidos los virus del SIDA y la Hepatitis, reduciendo los riesgos de invasión bacteriana y viral. Retiene el exudado y mantiene el medio ambiente húmedo óptimo para el proceso de cicatrización. Mantiene el pH ligeramente Acido (5,0 – 6,0): reduce los riesgos de infección, por mayor actividad de los macrófagos en el control del crecimiento bacteriano. Favorece el desbridamiento autolítico: mantiene la humedad en el lecho de la herida favoreciendo la acción de las enzimas endógenas para la remoción natural del tejido necrótico. Absorción de Exudado: las sustancias hidrocoloideas tienen capacidad de absorber y controlar el exudado, permitiendo cambios de apósito entre 1 y máximo 7 días. Impermeable a los líquidos: reduce los riesgos de contaminación de la lesión y mejora la calidad de vida del paciente ya que le permite realizar el baño general en ducha.
Recomendaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación. • Valorar el lecho de la lesión (condiciones de la herida) y la piel circundante. • Limpiar el lecho de la lesión y la piel circundante con solución salina normal, sin utilizar soluciones antisépticas. Secar bien la piel perilesional para asegurar la adhesividad del apósito a la piel sana. • Remover la mayor cantidad de tejido necrótico posible antes de iniciar la terapia o aplicar DuoDERM Gel. • Elegir un tamaño de apósito que sobrepase por lo menos 3 cm, el tamaño de la lesión. • Cambiar el apósito cuando se filtre por alguno de sus bordes. • Explicar al paciente las características del drenaje que se encuentra al retirar el apósito. • No utilizar el apósito en combinación con otros productos para el cuidado de las heridas no probados clínicamente por ConvaTec y sin autorización médica. <ul style="list-style-type: none"> • No debe utilizarse en individuos con sensibilidad o que hayan presentado reacción alérgica al apósito o a sus componentes. • La esterilidad está garantizada a menos que el envase unitario esté dañado o abierto antes de su uso. • Temperatura de almacenamiento 10°C – 25°C.
Empaque secundario	Caja de cartón.
Empaque primario	Filme de polietileno-poliéster / papel.
País de origen	Estados Unidos.
Vida útil	5 años.