




AVISO: NO SE RECOMIENDA ESTE PRODUCTO A JÓVENES NI A PERSONAS NO-FUMADORES.

Lean detenidamente este prospecto antes de usar este producto. Contiene información importante. Guarde este prospecto, podría servirle de nuevo.

DISPOSITIVO DESECHABLE, NO RELLENAR NI INTENTAN RECARGAR.

POR FAVOR, DESECHAR ESTE DISPOSITIVO SI OBTIENE UN GOLPE EN SECO QUEMANTE.



1. Evitar ingestión del e-Líquido.
2. No intentar extraer el líquido del dispositivo.
3. No dejar caer, ni arroje ni manipule este producto ya que la carcasa exterior o los componentes internos pueden dañarse.
4. Para prolongar el funcionamiento de su producto, manténgalo alejado de temperaturas excesivas y ambientes húmedos.
5. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños y mujeres embarazadas.

CONDICIONES DE ALMACENAJE

Conservar en un ambiente con temperaturas entre 18-30 grados Celsius, fuera de la luz solar directa.

NO refrigerar ni congelar, ni almacenar en temperaturas por encima de 30 grados Celsius.

CONTRAINDICACIONES

Debido al propilenglicol:

Pueden aparecer efectos adversos en pacientes tratados con disulfiram o metronidazol. Las personas con antecedentes de atopía, rinitis alérgicas agudas o eczema atópicos pueden ser susceptibles a desarrollar reacciones alérgicas.

La acidosis láctica puede ocurrir cuando los niños, las mujeres embarazadas y los pacientes con insuficiencia hepática o renal consumen propilenglicol en grandes cantidades.

Debido al glicerol:

Las posibilidades de deshidratación aumentan en pacientes ancianos o ya hidratados. Se debe tener precaución en pacientes diabéticos ya que cuando el glicerol metabolizado puede causar una ligera hiperglucemia.

GRUPOS DE RIESGO ESPECIFICOS

Este producto no está recomendado para uso en menores de edad, mujeres embarazadas o durante la lactancia.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Los nuevos usuarios de cigarrillos electrónicos pueden experimentar sequedad de garganta, tos seca, dolor leve o irritación de la boca o del tracto respiratorio. Si los síntomas se vuelven severos o duran más de 48 horas consulte a su médico de cabecera e informe sobre el incidente al distribuidor/fabricante que se indica a continuación y en la caja del producto.

Posibles efectos adversos de la retirada de nicotina: irritabilidad o agresión, sensación de depresión, ansiedad, inquietud, falta de concentración, aumento del apetito o aumento de peso, ganas de fumar (antojos), despertar nocturno o alteraciones del sueño, disminución de la frecuencia cardíaca.

ADICCIÓN

Este producto contiene nicotina, que es una sustancia altamente adictiva y, por lo tanto, no se recomienda su uso por no fumadores. No se conoce que otros ingredientes de este producto sean adictivos.

TOXICIDAD

Este producto contiene nicotina que puede producir efectos tóxicos si se consume por vía oral, especialmente en menores. NO ingiera este producto. En caso de ingestión accidental, por favor tome este prospecto y llame inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o médico de cabecera, y dar la referencia H301. En caso de contacto con la piel, enjuague inmediatamente con agua fría durante al menos 15 minutos.

INFORMACION DEL FABRICANTE

Diamond Mist
128 Cannon Workshops, Cannon Drive
LONDRES
EH 4AS
Contacto en España,
SRIN Horizon Europe SL

info@vapeditribution.com

Tel.: 951265176 de Lunes a viernes de 9.30 a 18.30

