




PICCIONI

Preparazione e riproduzione



| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | Utilizzo |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Base | Lisocur➔ Miobol Comedol | Lisocur➔ Miobol Comedol | Lisocur➔ Miobol Comedol | Lisocur➔ Miobol Comedol | Lisocur➔ Miobol Comedol | Lisocur➔ Miobol Comedol | Lisocur➔ Miobol Comedol | <p>15 ml in 2 l di acqua o per kg di mangime</p> <p>30 g (2 cucchiaini) per kg di mangime</p> <p>15 ml (1 cucchiaino) per kg di mangime</p> |
| Estensione 1 | Roni | Roni | Roni | Roni | Roni | Roni | Roni | <p>10 g per 2 l di acqua (la soluzione è leggermente torbida) o per kg di mangime</p> |
| Estensione 2 | Fertibol | Fertibol | Fertibol | Fertibol | Fertibol | Fertibol | Fertibol | <p>30 ml per kg di mangim</p> |
| Estensione 3 | Stopmite Clean Oral | Stopmite Clean Oral | Stopmite Clean Oral | Stopmite Clean Oral | Stopmite Clean Oral | Stopmite Clean Oral | Stopmite Clean Oral | <p>25 g per kg di mangime</p> <p>Da 1 ml a 5 ml per litro d'acqua</p> |