

Auch andere, oben nicht aufgeführte Substanzen können eine Lichtempfindlichkeit verursachen.

Gängige Beispiele für diese Substanzen sind:

Johanniskraut, Steinkohlenteer, Deodorants, antibakterielle Seifen, künstliche Süßstoffe, Naphthalin (Mottenkugeln), Erdölprodukte, Aufheller in Waschmitteln und Cadmiumsulfid (eine Chemikalie, die beim Tätowieren in die Haut injiziert wird).

Es gibt einige Fälle, in denen sich das Omnilux Contour als ungeeignet für eine Person erweisen kann. Bestimmte Erkrankungen oder Medikamente können dazu führen, dass eine Person diese Behandlung nicht durchlaufen kann.

Vorsichtsmaßnahmen bei medikamenteninduzierter Lichtempfindlichkeit.

Wenn Sie eines der unten aufgeführten Medikamente einnehmen, lesen Sie bitte den Kommentarteil der Tabelle sorgfältig durch.

Medikamentenart	Spezifische Gruppe oder gebräuchlicher Name	Kommentare
Antarthritikum	Gold 50 oder Ridaura	Wenn JA, kann die Behandlung nicht durchgeführt werden
Antarthritikum oder Immunsuppressivum	Azathioprin (Imuran, Azasan)	Wenn JA, kann die Behandlung durchgeführt werden, sofern das Medikament nicht innerhalb der letzten 5 Tage eingenommen wurde.
Antiarrhythmikum	Amiodaron (Cordarone, Pacerone), Aratac	Wenn JA, kann die Behandlung durchgeführt werden, sofern das Medikament nicht innerhalb der letzten 5 Tage eingenommen wurde.
	Chinidin	Wenn JA und der Kunde derzeit das Medikament einnimmt, liegt es im Ermessen des Kunden, ob er mit der Behandlung beginnt. Es besteht eine 10/100-Wahrscheinlichkeit einer leichten Reaktion. Wenn der Kunde die Einnahme des Medikaments für ≥ 5 Tage unterbrochen hat, kann die Behandlung durchgeführt werden.

Medikamentenart	Spezifische Gruppe oder gebräuchlicher Name	Kommentare
Antibiotika	Fluorchinolone: Ciprofloxacin (Cipro), Levofloxacin (Levaquin), Lomefloxacin (Maxaquin), Norfloxacin (Noroxin), Ofloxacin (Floxin) Tetracycline: Demeclocyclin (Declomycin), Doxycyclin (Vibramycin), Minocyclin (Minocin), Oxytetracyclin (Terramycin) Andere: Azithromycin (Zithromax), Capreomycin (Capastat), Ceftazidim (Fortaz), Cycloserin (Seromycin), Metronidazol (Flagyl), Nalidixinsäure (NegGram), Pyrazinamid, Sulfamethoxazol/Trimethoprim (Bactrim)	Wenn JA, kann die Behandlung durchgeführt werden, sofern das Medikament nicht innerhalb der letzten 5 Tage eingenommen wurde.
Krebsmedikamente	Bexaroten (Targretin), Capecitabin (Xeloda), Dacarbazin (DTIC), Epirubicin (Ellence), Fluorouracil (5-FU), Interferon alfa (Intron A, Alferon-N), Methotrexat (Mexate), Pentostatin (Nipent), Procarbazin (Matulane), Tretinoin, oral (Vesanoid), Vinblastin (Velban, Velbe)	Wenn JA und der Kunde derzeit das Medikament einnimmt, liegt es im Ermessen des Kunden, ob er mit der Behandlung beginnt. Es besteht eine 1/100- bis 5/100-Wahrscheinlichkeit einer leichten Reaktion. Wenn der Kunde die Einnahme des Medikaments für ≥ 5 Tage unterbrochen hat, kann die Behandlung durchgeführt werden.
Antikonvulsiva	Carbamazepin (Tegretol), Felbamat (Felbatol), Gabapentin (Neurontin), Lamotrigin (Lamictal), Oxcarbazepin (Trileptal), Topiramamat (Topamax), Valproinsäure (Depakene)	Wenn JA und der Kunde derzeit das Medikament einnimmt, liegt es im Ermessen des Kunden, ob er mit der Behandlung beginnt. Es besteht eine 1/100-Wahrscheinlichkeit einer leichten Reaktion. Wenn der Kunde die Einnahme des Medikaments für ≥ 5 Tage unterbrochen hat, kann die Behandlung durchgeführt werden.
Antimykotika	Flucytosin (Ancobon), Griseofulvin (Fulvicin, Gris-PEG), Terconazol (Terazol) Voriconazol (VFEND)	Wenn JA, kann die Behandlung durchgeführt werden, sofern das Medikament nicht innerhalb der letzten 5 Tage eingenommen wurde.
Antihistaminika	Cetirizin (Zyrtec), Diphenhydramin (Benadryl), Loratadin (Claritin), Promethazin (Phenergan)	Wenn JA, kann die Behandlung durchgeführt werden, sofern das Medikament nicht innerhalb der letzten 5 Tage eingenommen wurde.

Medikamentenart	Spezifische Gruppe oder gebräuchlicher Name	Kommentare
Antihypertensiva	Captopril (Capoten), Diltiazem (Cardizem, Tiazac), Enalapril (Vasotec), Nifedipin (Procardia), Sotalol (Betapace)	Wenn JA, kann die Behandlung durchgeführt werden, sofern das Medikament nicht innerhalb der letzten 5 Tage eingenommen wurde.
Malariamedikamente	Chloroquin (Aralen), Hydroxychloroquin (Plaquenil), Pyrimethamin (Daraprim), Pyrimethamin/Sulfadoxin (Fansidar), Chinin	Wenn JA, kann die Behandlung durchgeführt werden, sofern das Medikament nicht innerhalb der letzten 5 Tage eingenommen wurde.
Antipsychotika	Phenothiazine: Chlorpromazin (Thorazin), Fluphenazin (Prolixin), Perphenazin (Trilafon), Prochlorperazin (Compazin), Thioridazin (Mellaril), Trifluoperazin (Stelazin)	Wenn JA und der Kunde derzeit das Medikament einnimmt, liegt es im Ermessen des Kunden, ob er mit der Behandlung beginnt. Es besteht eine 2/100- bis 3/100-Wahrscheinlichkeit einer leichten Reaktion. Wenn der Kunde die Einnahme des Medikaments für ≥ 5 Tage unterbrochen hat, kann die Behandlung durchgeführt werden.
Antiretrovirale Mittel	Ritonavir (Norvir), Saquinavir (Fortovase, Invirase), Zalcitabin (Hivid)	Wenn JA, liegt es im Ermessen des Kunden, ob er mit der Behandlung beginnt. Wenn JA, liegt es im Ermessen des Kunden, ob er mit der Behandlung beginnt. Es besteht eine etwa 2/100-Wahrscheinlichkeit einer leichten Reaktion.
Antivirale Mittel	Amantadin (Symmetrel), Acyclovir (Zovirax)	Wenn JA und der Kunde derzeit das Medikament einnimmt, liegt es im Ermessen des Kunden, ob er mit der Behandlung beginnt. Es besteht eine etwa 1/100-Wahrscheinlichkeit einer leichten Reaktion. Wenn der Kunde die Einnahme des Medikaments für ≥ 5 Tage unterbrochen hat, kann die Behandlung durchgeführt werden.

Medikamentenart	Spezifische Gruppe oder gebräuchlicher Name	Kommentare
Kardiovaskuläre Medikamente	Thiazid-Diuretika: Bendroflumethiazid (Corzid), Chlorthalidon (Thaliton), Hydrochlorothiazid (Microzide), Hydroflumethiazid (Diucardin), Indapamid (Lozol), Methyclothiazid (Enduron), Metolazon (Zaroxolyn), Polythiazid (Renese) Diuretika, Sonstige: Furosemid (Lasix), Triamteren (Dyrenium)	Wenn JA, kann die Behandlung durchgeführt werden, sofern das Medikament nicht innerhalb der letzten 5 Tage eingenommen wurde.
Lipidregulatoren, Sonstige	Fenofibrat (Tricor)	Wenn JA, und der Kunde derzeit das Medikament einnimmt, liegt es im Ermessen des Kunden, ob er mit der Behandlung beginnt. Es besteht eine 10/100-Wahrscheinlichkeit einer leichten Reaktion. Wenn der Kunde die Einnahme des Medikaments für ≥ 5 Tage unterbrochen hat, kann die Behandlung durchgeführt werden.
Nichtsteroidale Entzündungshemmer (NSAIDs) Analgetika	Diclofenac (Voltaren, Cataflam), Naproxen (Anaprox)	Wenn JA und der Kunde derzeit das Medikament einnimmt, liegt es im Ermessen des Kunden, ob er mit der Behandlung beginnt. Es besteht eine $< 1/100$ -Wahrscheinlichkeit einer leichten Reaktion. Wenn der Kunde die Einnahme des Medikaments für ≥ 1 Tag unterbrochen hat, kann die Behandlung durchgeführt werden.
Beruhigungsmittel	Alprazolam (Xanax), Chlordiazepoxid (Librium), Zaleplon (Sonata), Zolpidem (Ambien)	Wenn JA und der Kunde derzeit das Medikament einnimmt, liegt es im Ermessen des Kunden, ob er mit der der Behandlung beginnt. Es besteht eine 1/100-Wahrscheinlichkeit einer leichten Reaktion. Wenn der Kunde die Einnahme des Medikaments für ≥ 5 Tage unterbrochen hat, kann die Behandlung durchgeführt werden.

Medikamentenart	Spezifische Gruppe oder gebräuchlicher Name	Kommentare
Statine	Fluvastatin (Lescol), Lovastatin (Mevacor), Pravastatin (Pravachol), Simvastatin (Zocor)	Wenn JA und der Kunde derzeit das Medikament einnimmt, liegt es im Ermessen des Kunden, ob er mit der Behandlung beginnt. Es besteht eine $< 0,5/100$ -Wahrscheinlichkeit einer leichten Reaktion. Wenn der Kunde die Einnahme des Medikaments für ≥ 5 Tage unterbrochen hat, kann die Behandlung durchgeführt werden.
Skin agents (acne)	Isotretinoin (Accutane, Roaccutane) Tretinoin topical (Renova, Retin-A) Tazarotene (Tazorac)	Wenn JA und der Kunde derzeit das Medikament einnimmt, liegt es im Ermessen des Kunden, ob er mit der Behandlung beginnt. Es besteht eine $5/100$ - und eine $10/100$ -Wahrscheinlichkeit einer leichten Reaktion. Wenn der Kunde die Einnahme des Medikaments für ≥ 5 Tage unterbrochen hat, kann die Behandlung durchgeführt werden.
Hautmittel (Haare)	Steinkohlenteer, Minoxidil (Rogaine)	Wenn JA, und der Kunde derzeit das Medikament einnimmt, liegt es im Ermessen des Kunden, ob er mit der Behandlung beginnt. Es besteht eine $< 0,5/100$ -Wahrscheinlichkeit einer leichten Reaktion. Wenn der Kunde die Einnahme des Medikaments für ≥ 5 Tage unterbrochen hat, kann die Behandlung durchgeführt werden.