

D'autres substances non énumérées ci-dessus peuvent également provoquer une photosensibilité.

Des exemples courants de ces substances sont :

Millepertuis, goudron de houille, déodorants, savons antibactériens, édulcorants artificiels, naphthaline (boules de naphthaline), produits pétroliers, agents de blanchiment contenus dans les détergents à lessive et sulfure de cadmium (produit chimique injecté dans la peau lors du tatouage).

L'utilisation de l'Omnilux Contour peut ne pas être adaptée à certaines personnes. Le traitement peut ne pas être adapté selon l'état de santé ou les traitements de chaque individu.

Précautions liées à la photosensibilité induite par le médicament.

Si vous prenez l'un des médicaments énumérés ci-dessous, veuillez lire attentivement la section des commentaires du tableau.

Type de médicament	Groupe spécifique ou nom courant	Commentaires
Antiarthritique	Gold 50 ou Ridaura	Si OUI, le traitement ne peut pas être administré
Antiarthritique ou immunosuppresseur	azathioprine (Imuran, Azasan)	Si OUI, le traitement peut être administré à condition que le médicament n'ait pas été pris au cours des 5 derniers jours.
Antiarythmique	amiodarone (Cordarone, Pacerone), aratac	Si OUI, le traitement peut être administré à condition que le médicament n'ait pas été pris au cours des 5 derniers jours.
	quinidine	Si OUI, et que le client prend actuellement le médicament, la décision de démarrer ou non le traitement est laissée à la discrétion du client. Il y a 10/100 de risque de réaction légère. Si le client a cessé de prendre le médicament depuis ≥ 5 jours alors le traitement peut être administré.

Type de médicament	Groupe spécifique ou nom courant	Commentaires
Antibiotiques	<p>Fluoroquinolones : ciprofloxacine (Cipro), lévofloxacine (Levaquin), loméfloxacine (Maxaquin), norfloxacine (Noroxine), ofloxacine (Floxin)</p> <p>Tétracyclines : déméclocycline (Déclomycine), doxycycline (Vibramycine), minocycline (Minocine), oxytétracycline (Terramycine)</p> <p>Autres : azithromycine (Zithromax), capréomycine (Capastat), ceftazidime (Fortaz), cyclosérine (Seromycin), métronidazole (Flagyl), acide nalidixique (NegGram), pyrazinamide, sulfaméthoxazole/triméthoprime (Bactrim)</p>	Si OUI, le traitement peut être administré à condition que le médicament n'ait pas été pris au cours des 5 derniers jours.
Anticancéreux	<p>bexarotène (Targretin), capécitabine (Xeloda), dacarbazine (DTIC), épirubicine (Ellence), fluorouracile (5-FU), interféron alfa (Intron A, Alferon-N), méthotrexate (Mexate), pentostatine (Nipent), procarbazine (Matulane), trétinoïne, orale (Vesanoid), vinblastine (Velban, Velbe)</p>	Si OUI, et que le client prend actuellement le médicament, la décision de démarrer ou non le traitement est laissée à la discrétion du client. Il y a entre 1/100 et 5/100 de risque de réaction légère. Si le client a cessé de prendre le médicament depuis ≥ 5 jours, alors le traitement peut être administré.
Anticonvulsivants	<p>carbamazépine (Tegretol), felbamate (Felbatol), gabapentine (Neurontin), lamotrigine (Lamictal), oxcarbazépine (Trileptal), topiramate (Topamax), acide valproïque (Dépakine)</p>	Si OUI, et que le client prend actuellement le médicament, la décision de démarrer ou non le traitement est laissée à la discrétion du client. Il y a 1/100 de risque de réaction légère. Si le client a cessé de prendre le médicament depuis ≥ 5 jours, alors le traitement peut être administré.
Antifongiques	<p>flucytosine (Ancobon), griséofulvine (Fulvicin, Gris-PEG), terconazole (Terazol) voriconazole (VFEND)</p>	Si OUI, le traitement peut être administré à condition que le médicament n'ait pas été pris au cours des 5 derniers jours.
Antihistaminiques	<p>cétirizine (Zyrtec), diphenhydramine (Benadryl), loratadine (Clarityne), prométhazine (Phenergan)</p>	Si OUI, le traitement peut être administré à condition que le médicament n'ait pas été pris au cours des 5 derniers jours.

Type de médicament	Groupe spécifique ou nom courant	Commentaires
Antihypertenseurs	captopril (Capoten), diltiazem (Cardizem, Tiazac), énalapril (Vasotec), nifédipine (Procardia), sotalol (Betapace)	Si OUI, le traitement peut être administré à condition que le médicament n'ait pas été pris au cours des 5 derniers jours.
Antipaludéen	chloroquine (Aralen), hydroxychloroquine (Plaquenil), pyriméthamine (Daraprim), pyriméthamine/sulfadoxine (Fansidar), quinine	Si OUI, le traitement peut être administré à condition que le médicament n'ait pas été pris au cours des 5 derniers jours.
Neuroleptiques	Phénothiazines : chlorpromazine (Thorazine), fluphénazine (Prolixin), perphénazine (Trilafon), prochlorpérazine (Compazine), thioridazine (Mellaril), trifluopérazine (Stelazine)	Si OUI, et que le client prend actuellement le médicament, la décision de démarrer ou non le traitement est laissée à la discrétion du client. Il y a entre 2/100 et 3/100 de risque de réaction légère. Si le client a cessé de prendre le médicament depuis ≥ 5 jours, alors le traitement peut être administré.
Antirétroviral	ritonavir (Norvir), saquinavir (Fortovase, Invirase), zalcitabine (Hivid)	Si OUI, la décision de démarrer ou non le traitement est laissée à la discrétion du client. Si OUI, la décision de démarrer ou non le traitement est laissée à la discrétion du client. Il y a environ 2/100 de risque de réaction légère.
Antiviral	amantadine (Symmetrel), aciclovir (Zovirax)	Si OUI, et que le client prend actuellement le médicament, la décision de démarrer ou non le traitement est laissée à la discrétion du client. Il y a environ 1/100 de risque d'une réaction légère. Si le client a cessé de prendre le médicament depuis ≥ 5 jours, alors le traitement peut être administré.

Type de médicament	Groupe spécifique ou nom courant	Commentaires
Cardiovasculaire	Diurétiques thiazidiques : bendrofluméthiazide (Corzide), chlorthalidone (Thalitone), hydrochlorothiazide (Microzide), hydrofluméthiazide (Diucardin), indapamide (Lozol), méthyclothiazide (Enduron), métolazone (Zaroxolyn), polythiazide (Renese) Diurétiques, autres : furosémide (Lasix), triamtèrene (Dyrenium)	Si OUI, le traitement peut être administré à condition que le médicament n'ait pas été pris au cours des 5 derniers jours.
Hypolipédiant, autres	fénofibrate (Tricor)	Si OUI, et que le client prend actuellement le médicament, la décision de démarrer ou non le traitement est laissée à la discrétion du client. Il y a 10/100 de risque de réaction légère. Si le client a cessé de prendre le médicament depuis ≥ 5 jours, alors le traitement peut être administré.
Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) Antalgiques	diclofénac (Voltarene, Cataflam), naproxène (Anaprox)	Si OUI, et que le client prend actuellement le médicament, la décision de démarrer ou non le traitement est laissée à la discrétion du client. Il y a $< 1/100$ de risque de réaction légère. Si le client a cessé de prendre le médicament depuis ≥ 1 jour, alors le traitement peut être administré.
Sédatifs	alprazolam (Xanax), chlordiazépoxyde (Librium), zaléplone (Sonata), zolpidem (Ambien)	Si OUI, et que le client prend actuellement le médicament, la décision de démarrer ou non le traitement est laissée à la discrétion du client. Il y a 1/100 de risque de réaction légère. Si le client a cessé de prendre le médicament depuis ≥ 5 jours, alors le traitement peut être administré.

Type de médicament	Groupe spécifique ou nom courant	Commentaires
Statines	fluvastatine (Lescol), lovastatine (Mevacor), pravastatine (Pravachol), simvastatine (Zocor)	Si OUI, et que le client prend actuellement le médicament, la décision de démarrer ou non le traitement est laissée à la discrétion du client. Il y a < 0,5/100 de risque de réaction légère. Si le client a cessé de prendre le médicament depuis ≥ 5 jours, alors le traitement peut être administré.
Produits pour la peau (acné)	isotrétinoïne (Accutane, Roaccutane), trétinoïne topique (Renova, Retin-A), tazarotène (Tazorac)	Si OUI, et que le client prend actuellement le médicament, la décision de démarrer ou non le traitement est laissée à la discrétion du client. Il y a entre 5/100 et 10/100 de risque de réaction légère. Si le client a cessé de prendre le médicament depuis ≥ 5 jours, alors le traitement peut être administré.
Produits pour la peau (cheveux)	goudron de houille, minoxidil (Rogaine)	Si OUI, et que le client prend actuellement le médicament, la décision de démarrer ou non le traitement est laissée à la discrétion du client. Il y a < 0,5/100 de risque de réaction légère. Si le client a cessé de prendre le médicament depuis ≥ 5 jours, alors le traitement peut être administré.