

Andere stoffen die hierboven niet zijn genoemd, kunnen ook lichtgevoeligheid veroorzaken.

Bekende voorbeelden van deze stoffen zijn:

Sint-Janskruid, koolteer, deodoranten, antibacteriële zepen, kunstmatige zoetstoffen, naftaleen (mottenballen), aardolieproducten, witmakers in wasmiddelen en cadmiumsulfide (een chemische stof die bij het tatoeëren in de huid wordt gespoten).

Er zijn enkele gevallen waarin de Omnilux Contour ongeschikt kan blijken voor een gebruiker. Bepaalde medische aandoeningen of geneesmiddelen kunnen betekenen dat de behandeling niet geschikt is voor de persoon.

Voorzorgsmaatregelen in verband met door geneesmiddelen veroorzaakte lichtgevoeligheid.

Als u een van de onderstaande geneesmiddelen gebruikt, lees dan zorgvuldig het gedeelte met opmerkingen van de tabel.

Type geneesmiddel	Specifieke groep of algemene benaming	Opmerkingen
Anti-artrose	Gold 50 of Ridaura	Indien JA, kan de behandeling niet worden gebruikt
Anti-artrose of immunosuppressivum	Azathioprine (Imuran, Azasan)	Indien JA, kan de behandeling worden gebruikt zolang de medicatie in de afgelopen 5 dagen niet is ingenomen.
Anti aritmie	Amiodarone (Cordarone, Pacerone), Aratac	Indien JA, kan de behandeling worden gebruikt zolang de medicatie de afgelopen 5 dagen niet is ingenomen.
	Quinidine	Indien JA, en de cliënt gebruikt momenteel de medicatie dan is het aan de cliënt om te beslissen of de behandeling wordt gestart. Er is een 10/100 kans op een reactie op het licht. Als de cliënt gedurende ≥ 5 dagen is gestopt met het innemen van de medicatie dan kan de behandeling worden gebruikt.

Type geneesmiddel	Specifieke groep of algemene benaming	Opmerkingen
Antibiotica	<p>Fluorchinolonen: Ciprofloxacin (Cipro), Levofloxacin (Levaquin), Lomefloxacin (Maxaquin), Norfloxacin (Noroxin), Ofloxacin (Floxin)</p> <p>Tetracyclinen: Demeclocycline (Declomycine), Doxycycline (Vibramycin), Minocycline (Minocin), Oxytetracycline (Terramycin)</p> <p>Overige: Azitromycine (Zithromax), Capreomycine (Capastat), Ceftazidime (Fortaz), cycloserine (Seromycin), Metronidazol (Flagyl), nalidixinezuur (NegGram), pyrazinamide, sulfamethoxazol/trimethoprim (Bactrim)</p>	Indien JA, kan de behandeling worden gebruikt zolang de medicatie in de afgelopen 5 dagen niet is ingenomen.
Antikanker	<p>Bexaroteen (Targretin), Capecitabine (Xeloda), Dacarbazine (DTIC), epirubicine (Ellence), fluorouracil (5-FU), interferon alfa (Intron A, Alferon-N), Methotrexaat (Mexate), Pentostatine (Nipent), Procarbazine (Matulane), Tretinoïne, oraal (Vesanoid), Vinblastine (Velban, Velbe)</p>	Indien JA, en de cliënt gebruikt momenteel de medicatie dan is het aan de cliënt om te beslissen of de behandeling wordt gestart. Er is een kans van 1/100 tot 5/100 op een reactie op het licht. Als de cliënt de medicatie gedurende ≥ 5 dagen niet heeft ingenomen, dan kan de behandeling worden gebruikt.
Anticonvulsiva	<p>Carbamazepine (Tegretol), Felbamate (Felbatol), Gabapentine (Neurontin), Lamotrigine (Lamictal), Oxcarbazepine (Trileptal), Topiramaat (Topamax), Valproïnezuur (Depakene)</p>	Indien JA, en de cliënt gebruikt momenteel de medicatie dan is het aan de cliënt om te beslissen of de behandeling wordt gestart. Er is een 1/100 kans op een reactie op het licht. Als de cliënt gedurende ≥ 5 dagen is gestopt met het innemen van de medicatie dan kan de behandeling worden gebruikt.
Antischimmelmiddelen	<p>Flucytosine (Ancobon), Griseofulvine (Fulvicin, Gris-PEG), Terconazol (Terazol) Voriconazol (VFEND)</p>	Indien JA, kan de behandeling worden gebruikt zolang de medicatie in de afgelopen 5 dagen niet is ingenomen.
Antihistamine	<p>Cetirizine (Zyrtec), Diphenhydramine (Benadryl), Loratadine (Claritin), Promethazine (Phenergan)</p>	Indien JA, kan de behandeling worden gebruikt zolang de medicatie in de afgelopen 5 dagen niet is ingenomen.

Type geneesmiddel	Specifieke groep of algemene benaming	Opmerkingen
Antihypertensiva	Captopril (Capoten), Diltiazem (Cardizem, Tiazac), Enalapril (Vasotec), Nifedipine (Procardia), Sotalol (Betapace)	Indien JA, kan de behandeling worden gebruikt zolang de medicatie in de afgelopen 5 dagen niet is ingenomen.
Antimalaria	Chloroquine (Aralen), Hydroxychloroquine (Plaquenil), Pyrimethamine (Daraprim), Pyrimethamine/sulfadoxine (Fansidar), kinine	Indien JA, kan de behandeling worden gebruikt zolang de medicatie de afgelopen 5 dagen niet is ingenomen.
Antipsychotica	Fenothiazines: Chloorpromazine (Thorazine), Flufenazine (Prolixin), Perfenazine (Trilafon), Prochloorperazine (Compazine), Thioridazine (Mellaril), Trifluoperazine (Stelazine)	Indien JA, dan is het aan de cliënt om te beslissen of de behandeling wordt gestart. Indien JA, dan is het aan de cliënt om te beslissen of de behandeling wordt gestart. Er is een kans van ongeveer 2/100 op een reactie op het licht.
Antiretrovirale medicatie	Ritonavir (Norvir), Saquinavir (Fortovase, Invirase), Zalcitabine (Hivid)	Indien JA, dan is het aan de cliënt om te beslissen of de behandeling wordt gestart. Indien JA, dan is het aan de cliënt om te beslissen of de behandeling wordt gestart. Er is een kans van ongeveer 2/100 op een reactie op het licht.
Antivirale medicatie	Amantadine (Symmetrel), Acyclovir (Zovirax)	Indien JA, en de cliënt gebruikt momenteel de medicatie dan is het aan de cliënt om te beslissen of de behandeling wordt gestart. Er is een kans van ongeveer 1/100 op een reactie op het licht. Als de cliënt de medicatie gedurende ≥ 5 dagen niet heeft ingenomen, dan kan de behandeling worden gebruikt.

Type geneesmiddel	Specifieke groep of algemene benaming	Opmerkingen
Cardiovasculair	Diuretica met thiazide: Bendroflumethiazide (Corzide), Chlorthalidone (Thalitone), Hydrochlorothiazide (Microzide), Hydroflumethiazide (Diucardin), Indapamide (Lozol), Methyclothiazide (Enduron), Metolazon (Zaroxolyn), Polythiazide (Renese) Diuretica, overige: Furosemide (Lasix), Triamterene (Dyrenium)	Indien JA, kan de behandeling worden gebruikt zolang de medicatie in de afgelopen 5 dagen niet is ingenomen.
Lipidenregelaars, overige	Fenofibraat (Tricor)	Indien JA, en de cliënt gebruikt momenteel de medicatie, dan is het aan de cliënt om te beslissen of de behandeling wordt gestart. Er is een 10/100 kans op een reactie op het licht. Als de cliënt gedurende ≥ 5 dagen is gestopt met het innemen van de medicatie dan kan de behandeling worden gebruikt.
Niet-steroïde anti-inflammatoire middelen (NSAID's) Analgetica	Diclofenac (Voltaren, Cataflam), Naproxen (Anaprox)	Indien JA, en de cliënt gebruikt momenteel de medicatie dan is het aan de cliënt om te beslissen of de behandeling wordt gestart. Er is een kans van $< 1/100$ op een reactie op het licht. Als de cliënt gedurende ≥ 1 dag is gestopt met het innemen van de medicatie dan kan de behandeling worden gebruikt.
Kalmerende middelen	Alprazolam (Xanax), Chlordiazepoxide (Librium), Zaleplon (Sonata), Zolpidem (Ambien)	Indien JA, en de cliënt gebruikt momenteel de medicatie dan is het aan de cliënt om te beslissen of de behandeling wordt gestart. Er is een 1/100 kans op een reactie op het licht. Als de cliënt gedurende ≥ 5 dagen is gestopt met het innemen van de medicatie dan kan de behandeling worden gebruikt.

Type geneesmiddel	Specifieke groep of algemene benaming	Opmerkingen
Statines	Fluvastatine (Lescol), Lovastatine (Mevacor), Pravastatine (Pravachol), Simvastatine (Zocor)	Indien JA, en de cliënt gebruikt momenteel de medicatie dan is het aan de cliënt om te beslissen of de behandeling wordt gestart. Er is een kans van <math><0,5/100</math> op een reactie op het licht. Als de cliënt gedurende ≥ 5 dagen is gestopt met het innemen van de medicatie dan kan de behandeling worden gebruikt.
Huidverzorgingsmiddelen (acne)	Isotretinoïne (Accutane, Roaccutane) Tretinoïne uitwendig (Renova, Retin-A) Tazarotene (Tazorac)	Indien JA, en de cliënt gebruikt momenteel de medicatie dan is het aan de cliënt om te beslissen of de behandeling wordt gestart. Er is een kans van 5/100 tot 10/100 op een reactie op het licht. Als de cliënt de medicatie gedurende ≥ 5 dagen niet heeft ingenomen, dan kan de behandeling worden gebruikt.
Huidverzorgingsmiddelen (haar)	Koolteer, Minoxidil (Rogaine)	Indien JA, en de cliënt gebruikt momenteel de medicatie, is het aan de cliënt om te beslissen of de behandeling wordt gestart. Er is een kans van <math><0,5/100</math> op een reactie op het licht. Als de cliënt gedurende ≥ 5 dagen is gestopt met het innemen van de medicatie dan kan de behandeling worden gebruikt.