

Kontraindikationen

Verwenden Sie das Omnilux Men NICHT zur Behandlung anderer als der in den Anwendungshinweisen aufgeführten Erkrankungen. Das Omnilux Men wurde nicht für andere als die aufgeführten Erkrankungen getestet, und das Risiko ist unbekannt.

Verwenden Sie das Omnilux Men NICHT, wenn Sie schwanger sind, eine Schwangerschaft planen oder stillen. Das Omnilux Men Produkt wurde NICHT an schwangeren oder stillenden Frauen getestet, daher ist das Risiko für Föten, Neugeborene oder schwangere Frauen unbekannt.

Verwenden Sie das Omnilux Men NICHT, wenn Sie an Lupus erythematodes, einem lichtempfindlichen Ekzem oder Albinismus leiden. Wenn Sie das Omnilux Men Produkt zur Behandlung dieser Erkrankungen verwenden, kann dies eine schwere Hautreaktion hervorrufen.

Verwenden Sie das Omnilux Men NICHT, wenn Sie an Photosensibilität (Lichtempfindlichkeit) leiden. Wenn Sie das Omnilux Men Produkt verwenden, obwohl Sie an einer Lichtempfindlichkeit leiden, kann dies eine schwere Hautreaktion hervorrufen.

Verwenden Sie das Omnilux Men NICHT, wenn Sie Medikamente einnehmen, die eine Lichtempfindlichkeit verursachen können. Wenn Sie das Omnilux Men Produkt verwenden und Medikamente einnehmen, die eine Lichtempfindlichkeit verursachen können, kann dies eine schwere Hautreaktion hervorrufen.

Verwenden Sie das Omnilux Men NICHT, wenn Sie unter lichtinduzierten Kopfschmerzen leiden.

Verwenden Sie das Omnilux Men NICHT, wenn Sie an einer genetischen Erkrankung der Augen leiden.

Lichtempfindlichkeit ist eine häufige Nebenwirkung verschiedener Medikamenten. Dazu können bestimmte Antibiotika, Chemotherapeutika und Diuretika gehören. Wenn Sie sich bezüglich der Einnahme von Medikamenten unsicher sind, fragen Sie Ihren Arzt.

Klicken Sie hier für eine Liste von Medikamenten, die Lichtempfindlichkeit verursachen können.