

Contra-indicaties

GEBRUIK Omnilux Men NIET voor de behandeling van andere aandoeningen dan vermeld in de indicaties voor gebruik. Het Omnilux Men is niet getest op andere aandoeningen dan die in de lijst zijn opgenomen, en het risico is onbekend.

GEBRUIK Omnilux Men NIET als u zwanger bent, de intentie heeft zwanger te worden of als u borstvoeding geeft. Het Omnilux Men is NIET getest op zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en daarom is het risico voor de foetus, de pasgeborene of de zwangere vrouw niet bekend.

GEBRUIK Omnilux Men NIET als u lijdt aan Lupus erythematosus, lichtgevoelig eczeem of albinisme. Als u het Omnilux Men gebruikt om deze aandoeningen te behandelen, kunt u een ernstige huidreactie veroorzaken.

GEBRUIK Omnilux Men NIET als u lijdt aan een fotosensitiviteitsaandoening (overgevoeligheid voor licht). Als u het Omnilux Men gebruikt en u lijdt aan een fotosensitiviteitsaandoening, kan dat een ernstige huidreactie veroorzaken.

GEBRUIK Omnilux Men NIET als u geneesmiddelen gebruikt die lichtgevoeligheid kunnen veroorzaken. Als u het Omnilux Men gebruikt en u gebruikt medicijnen die lichtgevoeligheid kunnen veroorzaken, kan dat een ernstige huidreactie veroorzaken.

GEBRUIK Omnilux Men NIET als u last heeft van hoofdpijn door licht.

GEBRUIK Omnilux Men NIET als u lijdt aan een genetische oogafwijking.

Lichtgevoeligheid is een veel voorkomende bijwerking van diverse medicijnen. Dit kunnen bepaalde antibiotica zijn, chemotherapiemedicatie, en diuretica. Raadpleeg uw arts als u twijfelt over de medicijnen die u gebruikt.

Klik hier voor een lijst van geneesmiddelen die fotosensitiviteit kunnen veroorzaken.