

Kontraindikationer

Använd INTE Omnilux Men för att behandla andra tillstånd än de som anges i indikationerna för användning. Omnilux Men har inte testats under några andra förhållanden än de som anges, och risken är inte känd.

Använd INTE Omnilux Men om du är gravid, planerar att bli gravid eller om du ammar. Omnilux Men har INTE testats på gravida eller ammande kvinnor och därför är eventuella risker för fostret, den nyfödda eller för den gravida kvinnan inte kända.

Använd INTE Omnilux Men om du har Lupus erythematosus, fotokänsligt eksem eller albinism. Om du använder Omnilux Men för att behandla dessa tillstånd kan du orsaka en allvarlig hudreaktion.

Använd INTE Omnilux Men om du är ljusöverkänslig (reaktioner framkallade av ljus). Om du är ljusöverkänslig och använder Omnilux Men kan du orsaka en allvarlig hudreaktion.

Använd INTE Omnilux Men om du tar något läkemedel som kan orsaka ljuskänslighet. Om du använder Omnilux Men och tar läkemedel som kan orsaka ljuskänslighet kan du orsaka en allvarlig hudreaktion.

Använd INTE Omnilux Men om du lider av ljusframkallad huvudvärk.

Använd INTE Omnilux Men om du har några genetiska tillstånd i ögonen.

Ljuskänslighet är en vanlig biverkning av olika läkemedel. Detta kan inkludera vissa antibiotika, kemoterapi och diuretika. Om du är osäker på något läkemedel som du använder, kontakta din vårdgivare.

Klicka här för att visa en lista över läkemedel som kan orsaka ljuskänslighet.