



ASEPTIDINA® 2%

SOLUCIÓN TÓPICA

Descripción

ASEPTIDINA® SOLUCIÓN TÓPICA al 2% de uso externo, es una solución antiséptica con potente actividad bactericida cuyo efecto antimicrobiano es causado por rompimiento de la membrana de la célula microbiana y efecto residual prolongado contra un amplio espectro de micro-organismo como bacterias Gram-positivas y Gram-negativas, hongos y virus. No se inactiva en presencia de materia orgánica, no se absorbe por la piel, no produce irritación o sensibilización.

Composición

Cada 100mL de ASEPTIDINA® SOLUCIÓN TÓPICA al 2% contiene Gluconato de Clorhexidina al 2% y alcohol isopropílico al 70% v/v.

Indicaciones

Antiséptico tópico indicado para el cuidado del sitio de inserción de catéter (cuidado de catéter), antisepsia de piel en muñón umbilical, preparación preoperatoria de la piel, antisepsia del sitio de inserción del catéter, en antisepsia de piel durante procedimientos de venopunción.

Instrucciones de Uso

Aplicar directamente sobre la piel impregnando una gasa o compresa estéril; previo lavado con ASEPTIDINA® JABON QUIRÚRGICO.

Beneficios

La presentación de unidosis evita el reenvase promoviendo un procedimiento seguro, ya que disminuye el riesgo de infecciones por contaminación del producto.

Precauciones y Advertencias

Hipersensibilidad a alguno de los componentes. Evitar el contacto con los ojos, oídos, boca y meninges. Uso externo únicamente, no debe usarse en mucosas. Es tóxico en oído medio. Reacciones alérgicas e irritación de la piel son extremadamente raras. Puede producir manchas oscuras en contacto con textiles. No mezclar con otros productos. No debe diluirse con agua solventes o mezclarse con otros jabones. Protéjase de la luz. Consérvese a temperatura menor a 30°C. Evite el contacto con los ojos ya que puede causar enrojecimiento, ardor e irritación de la conjuntiva, en casos extremos daño de la córnea. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Contraindicaciones

No debe diluirse con agua, solventes o mezclarse con otros jabones.

Estabilidad

Vida útil de dos (2) años a partir de la fecha de fabricación, almacenados a temperatura no mayor a 30° C en su envase original. Las temperaturas elevadas y los contaminantes pueden acelerar la descomposición. El producto es sensible a la luz. Almacene en lugares frescos y secos.

Datos de Seguridad

Los medios de extinción en caso de incendio que se pueden utilizar son: Agua, Dioxido de carbono, sustancia química seca, capa de espuma. En caso de derrames grandes absorba el material con tierra, arcilla o materiales absorbentes comerciales.

Compatibilidad con superficies

Las telas que se hayan impregnado con Clorhexidina deben ser enjuagadas con abundante agua antes de ser tratadas con Hipoclorito para evitar manchas difíciles de sacar con un simple lavado. Se inactiva en presencia de jabones aniónicos, presencia de cloro y aguas duras.

	REFERENCIA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE EMPAQUE
A	17011400	Frasco x 30 mL - Spray	Caja X 40 Frascos
B	17011500	Frasco x 60 mL - Spray	Caja X 30 Frascos
C	17011600	Frasco x 120 mL - Spray	Caja X 20 Frascos
D	17011700	Frasco x 240 mL - Spray	Caja X 12 Frascos
E	17011400-01	Frasco x 30 mL - Tapa de Seguridad	Caja X 40 Frascos
F	17012000	Frasco x 60 mL - Tapa de Seguridad	Caja X 36 Frascos
G	17011600-01	Frasco x 120 mL - Tapa de Seguridad	Caja X 25 Frascos
H	17011700-01	Frasco x 240 mL - Tapa de Seguridad	Caja X 12 Frascos



ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S.
 "PROASEPSIS" S.A.S.
 Av Calle 63 N° 74B - 42 Bodegas 7,8,9
 Parque Empresarial Normandía
 E-mail: proasepsis@proasepsis.com
 Bogotá D.C., Colombia

 **Servicio al Cliente**
 Bogotá 416 66 18 Resto del País 01-8000-11-11-22

VENTA LIBRE

Registro INVIMA 2012 M-0013206

www.proasepsis.com.co