

| | |
|--|---|
| | <p>No aplicar la solución si presenta turbidez o si la bolsa está colapsada.</p> <p>MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.</p> <p>Venta bajo fórmula médica.</p> |
| Posología y Modo de uso: | La que el médico señale |
| Incompatibilidades: | Únicamente con otras soluciones a base de cloruro de sodio, ya que pueden alterar el tratamiento esperado. |
| Reacciones adversas: | Riesgo de edema pulmonar y periférico si la infusión es demasiado rápida o abundante. En caso de que no se realice correctamente la dilución, dolor en el punto de inyección e irritación venosa. |
| Interacciones: | <i>Sales de litio (carbonato de litio):</i> hay estudios en los que se ha registrado que la administración conjunta de sales de litio y de sodio puede provocar una disminución de los niveles de litio, con posible inhibición de su efecto, debido a una expansión del volumen extracelular, que inhibe la reabsorción del litio. |
| Estabilidad: | El producto es estable durante 2 años almacenado a una temperatura inferior a 30°C. |
| Toxicidad: (Alta, media o baja) | Baja. |
| DL50 en humanos: | N/D |
| Condiciones de Almacenamiento y Transporte: | No almacenar ni transportar con sustancias que liberen gas o vapores, el producto debe ser almacenado en su empaque original. Almacenar a temperaturas no mayores de 30°C. |
| Medidas (Largo x ancho x alto): | Empaque primario: 90 x 42x 259.1 mm Empaque secundario: 42 x 26.5 x 32 cm |
| Unidad de empaque | Caja de cartón corrugado por 35 unidades de 500 mL |
| Peso de la unidad de empaque (Kg) | 19.9 Kg |
| Tiempo de vida útil: | 2 años a partir de la fecha de fabricación |
| Registro Sanitario No. | 2004M-0003272 |
| Fabricante: | Corporación de Fomento Asistencial del Hospital Universitario San Vicente de Paúl - CORPAUL |