

Calcium Oral

Ergänzungsfuttermittel mit Calcium und Vitamin D₃

Anwendung bei Tieren, bei denen in der vorherigen Laktation Milchfieber auftrat und bei Tieren, die die ersten Anzeichen von Milchfieber zeigen.



Ezinger GmbH
Unterpramau 1
A-4775 Taufkirchen/Pram
www.ezinger.eu

473200ATD1

Zulassungs Nr. des Herstellers: αDE NI 4 00076

Zusammensetzung: 11.1.6 Calciumchlorid, 11.2.6 Magnesiumchlorid

Zusatzstoffe / I:

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe

Vitamin D₃ (3a671) 3 200 I.U.

Technologische Zusatzstoffe:

Calciumpropionat (E282) 100 000 mg, Calciumacetat (E263) 46 000 mg

Inhaltsstoffe / I: Rohprotein 0,0 %, Rohasche 21,3 %, Rohfett 0,0 %, Rohfaser 0,0 %, Calcium 9,0 %, Natrium 0,2 %, Magnesium 1,9 %, Feuchtigkeit 85,1 %

Dosierung: Milchkühe: 500 ml, Schafe & Ziegen: 100 ml

Anwendung: Calcium Oral wird oral durch Herausdrücken des Flascheninhaltes direkt in das Maul verabreicht. Als vorbeugende Maßnahme gegen Milchfieber sollte Calcium Oral 6 bis 12 Stunden vor dem erwarteten Zeitpunkt der Kalbung/Lammung verabreicht werden. Eine zweite Dosis sollte direkt nach dem Kalben/Lammen gegeben werden. Wenn benötigt, kann eine dritte Gabe nach weiteren 6-12 Stunden erfolgen. Um eine tierärztliche Milchfiebertherapie zu unterstützen, sollte Calcium Oral 4 bis 6 Stunden nach der Calciuminjektion gegeben werden. Eine weitere Gabe sollte 6 bis 12 Stunden später erfolgen. Kein Einsatz bei festliegenden Tieren. Vor Gebrauch gut schütteln.

Stabilität/ Lagerung: Bei kühler (< 25°C) und trockener Lagerung in Originalverpackung 12 Monate nach Herstellungsdatum haltbar.

Nettovolumen: 500 ml

Batch:

Herstellungsdatum: