



# ÁCIDO ACETILSALICÍLICO COMPRIMIDOS 100 mg



## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, consulte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este Medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.

### Composición:

- Cada comprimido contiene:  
Ácido Acetilsalicílico 100 mg
- Excipientes: Croscarmelosa Sódica, Almidón de Maíz, Esencia de Vainilla Polvo, Esencia de Frutilla Polvo, Sucralosa, Celulosa Microcristalina.

### Clasificación:

Analgésico - antipirético - antiinflamatorio no esterooidal.

### Indicaciones:

Este medicamento se usa como analgésico en el tratamiento del dolor leve a moderado asociado a inflamación y para reducir la fiebre.

### Advertencias y Precauciones:

- Ácido Acetilsalicílico aumenta el riesgo de ulceración gastrointestinal durante el período de embarazo.
- Usar con precaución en lactancia.
- Suspender el Ácido Acetilsalicílico al menos 1 semana antes de una intervención quirúrgica.
- Precaución en niños deshidratados por ser éstos preferentemente susceptibles a la intoxicación por salicilatos.
- Si tomando Ácido Acetilsalicílico el dolor continúa por más de 7 días en adultos o 3 días en niños, consulte al Médico.
- Debe comunicar a su médico si sufre o ha sufrido problemas de sangramiento gastrointestinal o úlceras estomacales

### Contraindicaciones:

- No administrar en adultos o niños con fiebre mayor a 39 °C, que persista por más de 3 días.
- Pacientes con hipersensibilidad a los salicilatos. No usar en niños con varicela o influenza debido al riesgo de la aparición del síndrome de Reye.

### Interacciones:

Se han descrito interacciones con los siguientes medicamentos: Anticoagulantes orales, Heparina, Clorpropamida, Tolbutamida, Penicilinas y Cefalosporinas, Ácido Valproico, Agentes uricosúricos, Metotrexato, Fenitoína, Espironolactona, Alcohol.

### Presencia de otras enfermedades:

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. En caso de sufrir alguna enfermedad usted debe consultar al Médico o farmacéutico antes de ingerir este medicamento, especialmente en los casos siguientes: Anemia, Enfermedad renal o hepática, Gota, Asma, Hipertensión.

### Efectos adversos (no deseados):

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente al Médico si alguno de estos síntomas ocurre: Hemorragia gastrointestinal, dolor epigástrico, acidez estomacal, erupciones de la piel, zumbido de oídos, dolor de cabeza continuo o severo. Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo: malestar gástrico, náuseas.

### Dosis:

En niños lactantes según indicación médica, de 1 a 3 años 1 comprimido, 3 veces al día, de 4 a 6 años 2 comprimidos, 3 veces al día y de 7 a 9 años 3 comprimidos, 3 veces al día.

### Sobredosis:

En caso de ingestión involuntaria conduzca inmediatamente al intoxicado a un centro de atención médica hospitalario.

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 25 °C. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA**