

AMOXICILINA 500 mg CÁPSULAS

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Este medicamento se lo han recetado a Ud. personalmente y no debe darlo a otras personas, puede perjudicarlas, aún cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos. Si usted presentara algún efecto secundario, comuníquese a su médico o farmacéutico. Este medicamento podría producir efectos no mencionados en este folleto.

Lo que contiene este folleto:

1. ¿Qué son las cápsulas de Amoxicilina? y ¿para qué son utilizadas?
2. ¿Qué necesita saber antes de tomar cápsulas de Amoxicilina?
3. ¿Cómo tomar las cápsulas de Amoxicilina?
4. Posibles efectos secundarios.
5. ¿Cómo almacenar las cápsulas de Amoxicilina?
6. Contenidos del envase y otras informaciones.

1. ¿Qué son las cápsulas de Amoxicilina? y ¿para qué son utilizadas?

¿Qué son las cápsulas de Amoxicilina?
La Amoxicilina es un antibiótico. El ingrediente activo es la amoxicilina. Ésta pertenece al grupo de los medicamentos llamados "penicilinas".
¿Para qué son utilizadas las cápsulas de Amoxicilina?
Tratamiento de las infecciones del tracto respiratorio superior e inferior, tracto urinario, de la piel y de tejidos blandos, sepsis intraabdominal y osteomielitis, producidas por organismos sensibles a la Amoxicilina demostrado por antibiograma.

2. ¿Qué necesita saber antes de tomar cápsulas de Amoxicilina?

No ingerir cápsulas de Amoxicilina:
• Si es alérgico a la Amoxicilina, Penicilina o algún otro de los ingredientes de esta medicina (enumerados en la sección 6).
• Si alguna vez ha sufrido de reacción alérgica a algún antibiótico. Esto incluye rash alérgico, inflamación de la cara o de la garganta.
No ingerir cápsulas de Amoxicilina si alguna de las situaciones anteriores aplica. Si usted no está seguro, informe a su médico o farmacéutico antes de tomar cápsulas de Amoxicilina.

Cuidados y precauciones:

Informe a su médico o farmacéutico antes de tomar cápsulas de Amoxicilina si usted:
• Sufre de fiebre glandular (fiebre, dolor de garganta, inflamación de glándulas y cansancio extremo).
• Sufre de problemas al riñón.
• No está orinando con regularidad.
Si usted no está seguro de que los síntomas enumerados anteriormente le afecten, informe a su médico o farmacéutico antes de tomar cápsulas de Amoxicilina.

Exámenes de sangre y orina:

Si usted debe realizar:
• Exámenes de orina (glucosa) o exámenes de sangre para la función hepática.
• Examen de Estríol (usado durante el embarazo para confirmar que el feto está desarrollándose de manera normal).
Informe a su médico o farmacéutico si usted está tomando Amoxicilina. Esto debido a que el uso de cápsulas de Amoxicilina puede afectar el resultado de dichos exámenes.

Otros medicamentos y cápsulas de Amoxicilina:

Informe a su médico si está tomando, ha tomado recientemente o bien podría tomar otros medicamentos:
• Si usted está tomando Alopurinol (usado para el tratamiento de la gota), tiene más probabilidades de presentar una reacción alérgica en la piel.
• Si usted está tomando Probenecid (usado para el tratamiento de la gota), su médico tratante deberá decidir ajustar la dosis de cápsulas de Amoxicilina.
• Si usted está tomando medicamentos para ayudar a detener los coágulos sanguíneos (tales como la warfarina), usted necesitará exámenes de sangre adicionales.
• Si usted está tomando otros antibióticos (como la tetraciclina), las cápsulas de Amoxicilina podrían ser menos efectivas.
• Si usted está tomando metotrexato (usado para el tratamiento del cáncer y la psoriasis severa), las cápsulas de Amoxicilina podrían provocar un aumento de los efectos secundarios.

Embarazo y lactancia:

Si usted está embarazada o está amamantando, podría estar embarazada o bien planea tener un hijo, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

Conducción y operación de maquinaria:

Las cápsulas de Amoxicilina pueden tener efectos secundarios y síntomas (tales como reacciones alérgicas, mareo y convulsiones), que podrían volverlo no apto para la conducción.
No conduzca ni opere maquinaria a no ser que usted se sienta bien.

3. ¿Cómo tomar cápsulas de Amoxicilina?

Siempre tome este medicamento exactamente como su médico o farmacéutico le indicó.
Consulte con su médico o farmacéutico si usted no está seguro.
• Trague con agua sin abrir la cápsula.
• Ingeria la dosis ordenadamente durante el día, con al menos 4 horas de diferencia.

La dosis usual es de:

Niños que pesen menos de 40 kg
Todas las dosis se calculan dependiendo del peso corporal de cada niño en kilogramos:
• Su médico recomendará cuantas cápsulas de Amoxicilina deberá dar a su bebé o niño.
• La dosis habitual es de 40 mg a 90 mg por cada kilogramo de peso corporal por día, suministrada en dos o tres dosis divididas.
• La dosis máxima recomendada es de 100 mg por cada kilogramo de peso corporal por día.

Adultos mayores y niños con un peso de 40 kg o más

La dosis usual de cápsulas de Amoxicilina es de 250 mg a 500 mg tres veces al día de 750 mg a 1 g cada 12 horas, dependiendo de la severidad y el tipo de infección:
• Infecciones severas: 750 mg a 1 g tres veces al día.
• Infecciones del tracto urinario: 3 g dos veces al día por un día.
• Enfermedad de Lyme (infección provocada por garrapatas): Eritema migrans aislado (etapa inicial - erupción circular roja o rosada): 4 g por día, manifestaciones sistémicas (etapa tardía-para síntomas más serios o cuando la enfermedad se propaga por el cuerpo): hasta 6 g por día.
• Úlceras estomacales: una dosis de 750 mg o 1 g dos veces al día por 7 días, conjuntamente con otros antibióticos o medicamentos para tratar las úlceras estomacales.
• Para prevenir infección cardíaca durante una cirugía: la dosis variará de acuerdo al tipo de cirugía.
• Otros medicamentos pueden ser administrados al mismo tiempo. Su médico, farmacéutico o enfermera pueden proporcionarle más detalles.
• La dosis máxima recomendada es de 6 g por día.

Problemas al riñón

Si usted sufre de problemas al riñón, la dosis debe ser inferior a la dosis habitual.

Si usted toma más cápsulas de Amoxicilina de lo debido

Si usted ha ingerido demasiadas cápsulas de Amoxicilina, los síntomas podrían ser molestias estomacales (sentirse enfermo o diarrea) o cristales en la orina, lo cual puede provocar un aspecto turbio en la orina o problemas al orinar. Informe a su médico a la brevedad posible. Lleve con usted el medicamento para mostrárselo a su médico.

Si usted olvida tomar las cápsulas de Amoxicilina

Si usted olvida tomar una dosis, tómela tan pronto lo recuerde.
No tome la próxima dosis muy prontamente, espere alrededor de 4 horas antes de ingerir la siguiente dosis.
No tome una doble dosis en caso de que haya olvidado una de ellas.

¿Por cuánto tiempo debería tomar cápsulas de Amoxicilina?

Mantenga su tratamiento con cápsulas de Amoxicilina por el tiempo que su médico le ha indicado, incluso si se siente mejor. Usted necesita cada una de las dosis para combatir la infección. Si alguna bacteria sobreviviera podría provocar el regreso de la infección.
Si usted no se siente recuperado una vez finalizado su tratamiento, consulte a su médico.
Aftas (infección de las mucosas provocada por un hongo que causa dolor, picazón y secreciones blancas).
Podrían desarrollarse luego del uso extendido de Amoxicilina. Si esto ocurre, consulte a su médico.
Si usted ha estado en tratamiento con cápsulas de Amoxicilina por un período prolongado de tiempo, su médico podría efectuar exámenes adicionales para controlar que sus riñones, hígado y sangre estén funcionando adecuadamente.
Si usted tiene alguna inquietud sobre el uso de este medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles Efectos Secundarios

Como todos los medicamentos, éste puede provocar efectos secundarios, aunque no todas las personas pueden sufríroslos.
Suspenda el uso de cápsulas de Amoxicilina y consulte a su médico de inmediato, si usted experimenta alguno de los siguientes efectos secundarios severos, usted podría requerir tratamiento médico urgente.

Los siguientes son muy poco usuales (pueden afectar a 1 en 10.000 personas):

- Reacciones alérgicas, este síntoma puede incluir: picazón o erupción de la piel, inflamación de la cara, labios, lengua, cuerpo o dificultades para respirar. Estos pueden ser serios y ocasionalmente provocar la muerte.
- Erupción o puntos redondos planos de color rojo bajo la superficie de la piel o hematomas en la piel. Todo esto debido a la inflamación de las paredes de los vasos sanguíneos por la reacción alérgica. Puede también asociarse con dolor articular (artritis) y problemas a los riñones.
- Una reacción alérgica retardada puede ocurrir, usualmente, de 7 a 12 días luego de haber tomado cápsulas de Amoxicilina, alguno de los síntomas incluyen: erupciones, fiebre, dolor articular, aumento del tamaño de los ganglios linfáticos, especialmente, debajo de los brazos.
- Una reacción cutánea conocida como "eritema multiforme" donde usted podría desarrollar: parches de color púrpura rojizo en la piel acompañados de comezón, especialmente en las palmas de las manos o plantas de los pies, zonas de la piel inflamadas con urticaria, sensibilidad en el área de la superficie de la boca, ojos y genitales. Podría sufrir de fiebre y sentirse muy cansado.
- Otra reacción severa de la piel puede incluir: cambios en el color de la piel, bultos bajo la piel, sofocación de la piel, pústulas, peladuras rojizas, dolor, comezón, descamación. Estos síntomas pueden venir acompañados de fiebre, dolores de cabeza y de cuerpo.
- Fiebre, escalofríos, dolor de garganta u otros síntomas de infección. O si su piel presenta hematomas con facilidad, podría ser un signo de problemas con sus células sanguíneas.
- La reacción de Jarisch-Herxheimer, que puede ocurrir durante el uso de cápsulas de Amoxicilina en el tratamiento de la enfermedad de Lyme y causa fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular y erupción cutánea.

- Inflamación del intestino grueso (colon) con diarrea (algunas veces con sangre), dolor y fiebre.
- Efectos secundarios graves pueden afectar al hígado. Son principalmente asociados a personas que han mantenido tratamiento por períodos prolongados de tiempo, varones y adultos mayores. Usted debe informar a su médico urgentemente si presenta:
 - Diarrea severa con sangramiento.
 - Sofocación, enrojecimiento o hematomas.
 - Orina oscura o heces pálidas.
 - Color amarillo en la piel o en escleróticas (ictericia). Ver también anemia a continuación.
- Esto puede ocurrir luego de varias semanas posteriores de comenzado el tratamiento.

- Si alguno de los síntomas anteriores se presentaron, suspenda el uso del medicamento y consulte a su médico inmediatamente.
- En ocasiones usted podría sufrir reacciones cutáneas menos severas, tales como:
 - Una erupción leve con comezón (parches redondos de color rosado-rojo), zonas inflamadas con urticácea en la zona debajo de los brazos, piernas, palmas de las manos y plantas de los pies. Estos síntomas son poco comunes (pueden afectar a 1 de 100 personas).

- Si usted presenta alguno de estos síntomas, consulte con su médico si es necesario, suspender el uso de cápsulas de Amoxicilina.

Otros posibles efectos secundarios son:

- Comunes (pueden afectar a 1 de 10 personas):
 - Erupción cutánea.
 - Sentirse enfermo (náuseas) Diarrea.
 - Poco comunes (pueden afectar a 1 de 100 personas):
 - Estar enfermo (vomitar).
 - Muy poco comunes (pueden afectar a 1 de 10.000 personas):
 - Micosis (una infección provocada por hongos de la vagina, boca o los pliegues de la piel), usted puede conseguir un tratamiento para la micosis con su médico o farmacéutico.
 - Problemas al riñón.
 - Ataques (convulsiones), visto en pacientes sometidos a altas dosis o en pacientes con problemas al riñón.
 - Mareos.
 - Hiperactividad.
 - Cristales en la orina que la haría lucir más turbia, dificultad o incomodidad al orinar.
- Asegúrese de consumir suficiente líquido para reducir la ocurrencia de estos síntomas.
- La lengua podría tornarse amarilla, marrón o negra y podría presentar una apariencia vellosa.
 - Un colapso excesivo de los glóbulos rojos causando algún tipo de anemia. Los

- síntomas incluyen: cansancio, dolores de cabeza, falta de aliento, mareos, palidez y coloración amarilla en la piel y en escleróticas.
- Descenso en el número de glóbulos blancos.
- Descenso en el número de las células involucradas en la coagulación de la sangre.
- La sangre tardaría más de lo normal en coagular. Usted lo notará si le sangra la nariz o si se corta.

5. ¿Cómo almacenar cápsulas de Amoxicilina?

Manténgase fuera del alcance de los niños.
Almacenar en un lugar seco a una temperatura inferior a los 30°C.
No ingiera este medicamento luego de la fecha de vencimiento indicada en el cartón del envase. La fecha de expiración se entiende como el último día de dicho mes.
Si las cápsulas se volvieron descoloridas o mostraron signos de deterioro, consulte a su farmacéutico.

Recuerde que si su médico le recomienda suspender la ingesta de este medicamento, usted debe devolver las cápsulas sobrantes a su farmacéutico para que éste las elimine de manera segura. Conserve este medicamento sólo si su médico así se lo indica.
Los medicamentos no deben ser eliminados a través de aguas residuales o junto con los residuos domésticos. Consulte a su farmacéutico cómo desechar las medicinas que ya no usa. Estas medidas ayudarán a proteger el medio ambiente.

6. Contenidos del envase y otra información

Lo que las cápsulas de Amoxicilina contienen:
Ingrediente activo: Amoxicilina (como trihidrato).
Cada cápsula contiene 500 mg de Amoxicilina (como trihidrato), otros ingredientes son: Talco Puro, Magnesio Estearato, Gelatina, Dióxido de Titanio, Colorante Ponceau 4R, Colorante FD&C Rojo N°40, Colorante FD&C Amarillo N°5 (tartrazina), Colorante FD&C Azul N°1, Lauril Sulfato de Sodio, Agua Purificada, c.s.
Cómo son las cápsulas de Amoxicilina y lo que contiene el envase.
La cápsula tamaño "0" de color rojo pardo contiene polvos de color blanco amarillento y gránulos.

Recomendaciones generales en relación al uso de antibióticos

Los antibióticos se usan para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias. No tienen efecto alguno en infecciones causadas por virus.
En algunas ocasiones una infección provocada por una bacteria no responde al antibiótico. Una de las razones más comunes para que esto ocurra, es que la bacteria causante de la infección es resistente al antibiótico que está siendo utilizado. Esto significa que pueden sobrevivir e incluso multiplicarse a pesar del antibiótico.

Las bacterias pueden volverse resistentes a los antibióticos por muchas razones. El uso responsable de antibióticos puede ayudar a reducir las oportunidades de que las bacterias se vuelvan resistentes a los mismos.
Cuando su médico prescribe un tratamiento antibiótico tiene la intención de tratar solamente la enfermedad que lo aqueja en ese momento. Poner atención a las siguientes recomendaciones le ayudará a prevenir el surgimiento de bacterias resistentes que podrían detener el poder de estos medicamentos:

1. Es muy importante que tome su antibiótico en la dosis recomendada, en los horarios y número de días indicados. Lea las instrucciones de la etiqueta y en caso de que usted no entienda, consulte a su médico o a su farmacéutico que le explicarán.

2. Usted no debería tomar un antibiótico a no ser que sea recetado por su médico, específicamente para usted y solamente para tratar la infección para la cual fue prescrito.

3. Usted no debería tomar antibióticos que han sido prescritos para otras personas, incluso si ellos tuvieron una infección similar a la suya.

4. Usted no debería dar a otras personas antibióticos que le fueron prescritos a usted.

5. Si usted tiene un sobrante del antibiótico, de acuerdo al tratamiento recomendado por su médico, consulte a su farmacéutico para una eliminación apropiada.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.
No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.
No recomende este medicamento a otra persona.

Fabricado por Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd., No. 1 Ruiyang Road, Yiyuan County, Shandong Province, China.

Importado por Difem Laboratorios S.A., Los Ceramistas 8685, La Reina, Santiago, Chile.
Distribuido por Droguería Difem, La Divisa 06, San Bernardo, Santiago, Chile.