



FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE BUTON® ADULTOS COMPRIMIDOS



Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.

Composición:

Cada comprimido contiene:

Atropina Sulfato Monohidrato 0,5 mg
Papaverina Clorhidrato 40 mg

Excipientes: Celulosa Microcristalina, Dióxido de Silicio Coloidal, Almidón Glicolato Sódico, Estearato de Magnesio, Lactosa Monohidrato.

Clasificación:

Atropina Sulfato Monohidrato es un agente antimuscarínico y Papaverina Clorhidrato es un alcaloide con efecto antiespasmódico.

Indicación:

Tratamiento sintomático de los espasmos intestinales o renales, dismenorrea y salivación o sudoración excesiva.

Advertencia:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.

• Administrar con precaución en pacientes con glaucoma, estenosis pilórica, colitis ulcerosa, insuficiencia cardiaca, enfermedad hepática o renal, con precaución en pacientes menores de 6 años, hipertensos ó senescentes.

Contraindicaciones:

Si su Médico no ha dispuesto otra cosa Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

- Hipersensibilidad a Atropina Sulfato Monohidrato, Papaverina Clorhidrato o a cualquier componente de la formulación.
- Embarazo y Lactancia.
- Pacientes con obstrucción orgánica del tubo digestivo, dolor intestinal de etiología incierta, hipertrofia prostatica, glaucoma de ángulo estrecho, miastenia gravis, colitis ulcerativa.

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Ud. debe comunicar a su Médico o farmacéutico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta médica, antes de usar este fármaco, especialmente si se trata de: Amantadina, Kaolin, Atapulgita, Antiparkinsonianos, antiácidos, Levodopa, antidepressivos tricíclicos, Procainamida, Quinidina. Ud. no debe ingerir Alcohol mientras toma este medicamento.

Presencia de otras enfermedades:

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. En caso de sufrir alguna enfermedad Ud. debe consultar al Médico antes de ingerir este medicamento, especialmente en los casos siguientes: glaucoma, sangramiento, fiebre, estenosis pilórica, colitis, angina, insuficiencia cardiaca, hipertensión, enfermedad hepática o renal.

Efectos Adversos (no deseados):

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente al Médico si alguno de estos síntomas ocurre: confusión, visión borrosa, taquicardia, palpitaciones, rash, urticaria, hipotensión o aumento de la presión sanguínea.

Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo: constipación, sequedad de la boca, nariz o garganta, visión borrosa, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, somnolencia, mareos.

Forma de Administración:

Vía oral.

Dosis:

El Médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado para su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada en adultos es de 1 comprimido 3 ó 4 veces al día.

Sobredosis:

Conduzca al intoxicado a un Centro de Atención Médico.

Condiciones de Almacenamiento:

manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 25 °C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA**

V2
730487
13.01.14