



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

CEFADROXILO CÁPSULAS 500 mg



Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.

Composición:

Cada cápsula contiene:

Cefadroxilo (como Monohidrato) 500 mg

Excipientes: Dióxido de Silicio Coloidal, Estearato de Magnesio, Almidón Sodio Glicolato, Lauril Sulfato de Sodio, Lactosa Monohidrato, Colorante FD&C Rojo N° 40, Colorante FD&C Azul N°1, Dióxido de Titanio.

Clasificación:

Antibiótico.

Indicación:

Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, piel y su estructura y del tracto genitourinario causadas por organismos susceptibles.

Advertencias y Precauciones:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.

- Es importante administrar Cefadroxilo por el tiempo completo de tratamiento prescrito.
- El tratamiento con Cefadroxilo altera la flora normal y puede ocurrir un sobrecrecimiento de organismos no susceptibles, incluyendo hongos.

Contraindicaciones:

Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

- Alergia a Cefadroxilo, otra Cefalosporina o Penicilina, o alguno de los componentes de la formulación.

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros fármacos o alimentos, con consecuencias dañinas para su organismo, por lo que Ud. debe informar a su Médico si está tomando otros medicamentos, ya sea con o sin receta médica, especialmente si se trata de: Heparina, anticoagulantes orales, Ácido Valproico, Probenecid, Pentoxifilina, Dipyridamol. No olvide mencionar que está tomando este medicamento, en caso de requerir atención médica por otras razones, o en caso que se someta a algún examen.

Presencia de otras Enfermedades:

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. En caso de sufrir alguna enfermedad severa, debe consultar al Médico o Farmacéutico antes de ingerir este medicamento, especialmente en los casos siguientes: alergia, sangramiento, enfermedad renal o hepática, antecedentes de enfermedad gastrointestinal, diabetes Mellitus.

Efectos Adversos (no deseados):

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente al Médico si alguno de estos síntomas ocurre: dolor abdominal severo, diarrea severa, convulsiones, infección por Cándida, reacciones de hipersensibilidad manifestadas por rash cutáneo, prurito, fiebre, escalofríos y/o edema.

Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo: dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea suave, dolor de estómago, irritación en la boca, lengua o vagina.

Forma de Administración:

Vía oral.

Dosis:

El Médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados para su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada en adultos es de 500 mg 2 veces al día.

Sobredosis:

En caso de ingestión involuntaria conduzca inmediatamente al intoxicado a un Centro de Atención Médico.

Condiciones de Almacenamiento:

Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 25 °C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA**