

ELCAL D[®]

CÁPSULAS



Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

CONDICIÓN DE VENTA

Directa en establecimientos tipo A y B.

CLASIFICACIÓN

Suplemento de minerales.

COMPOSICIÓN

Cada cápsula contiene:

Carbonato de calcio 800 mg

(Equivalente a 320 mg de calcio iónico)

Colecalciferol 1,250 mg

(Equivalente a 125 U.I. de vitamina D3)

Excipientes: povidona, laurilsulfato de sodio, dióxido de silicio coloidal, almidón glicolato sódico, colorante FD&C azul N°1, colorante FD&C rojo N°40, dióxido de titanio, colorante FD&C amarillo N°5, gelatina, c.s..

1.- ¿PARA QUÉ SE USA?

Suplemento de calcio en estados carenciales asociados a un déficit de vitamina D.

2.- ADMINISTRACIÓN (ORAL)

- Rango y frecuencia

Adultos: 1 a 2 cápsulas 2 veces al día.

- Consejo de cómo administrarlo

No debe tomar el calcio en forma conjunta con otros medicamentos (especialmente: tetraciclina, fluoruros, cimetidina, ranitidina, famotidina). Debe tomarlo 1 a 2 horas después de haber ingerido el otro medicamento.

Se recomienda tomar este medicamento junto con alguna comida.

Tome el medicamento con un vaso lleno de agua o jugo.

- Uso prolongado

A pesar que el calcio y la vitamina D son necesarios para el organismo, un consumo excesivo o por un periodo prolongado de este medicamento sin control periódico de su médico, puede conducir a efectos dañinos severos sobre su salud.

3.- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Consumo de alcohol

No consuma grandes cantidades de alcohol, café y tabaco, durante el tratamiento con calcio y vitamina D, ya que éstos pueden disminuir la absorción del medicamento.

- Embarazo

El uso de este medicamento durante el embarazo debe ser bajo prescripción médica.

- Lactancia

El uso de este medicamento durante la lactancia debe ser bajo prescripción médica.

- Lactantes y niños

No administrar a niños menores de 12 años sin indicación médica.

- Precauciones especiales

Recuerde que la cantidad total de calcio que usted consume cada día incluye la de los alimentos, además del proveniente de este suplemento.

No ingiera otros medicamentos o suplementos que contengan grandes cantidades de calcio, fosfato o vitamina D, a menos que su médico lo indique.

No ingiera antiácidos u otros medicamentos que contengan magnesio, ya que si toma estos medicamentos juntos se pueden producir efectos no deseados.

4.- USTED NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

Si ha presentado síntomas de alergia al calcio carbonato y/o vitamina D.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5.- INTERACCIONES

- Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros, particularmente ácido alendrónico, fenitoína, sales de hierro, sales de zinc, hidroclorotiazida, digoxina, tetraciclina, vitamina D, otros medicamentos que contengan calcio y/o vitamina D, anticonceptivos, antiácidos que contengan magnesio.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

En el caso particular de este medicamento, si padece de diarrea, problemas intestinales, hiper o hipoparatiroidismo, sarcoidosis, alguna enfermedad a los huesos, cálculos renales, hipercalcemia (mucho calcio en la sangre) o hipercalciuria (mucho calcio en la orina).

- Alimentos

Debe evitar consumir cafeína en grandes cantidades, durante el tratamiento con este medicamento.

- Exámenes de laboratorio

Si se va a someter a algún examen médico, avísele a su médico a cargo que usted se encuentra en tratamiento con este medicamento.

6.- EFECTOS ADVERSOS

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: mareos, sensación de calor, arritmias, náuseas, vómitos, sudoración, dolor de estómago, debilidad, constipación severa, sed, gusto metálico, boca seca, irritabilidad, pérdida del apetito, ritmo cardíaco irregular, dificultad para orinar.

Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento: Sin embargo, consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: estreñimiento, gases.

7.- SOBREDOSIS

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: mareos, sensación de calor, arritmias, náuseas, vómitos, sudoración, constipación, diarrea, sequedad de boca, dolor de cabeza, debilidad, sabor metálico en la boca, aumento en la frecuencia para orinar. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, luz y humedad a no más de 25°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.

No recomiende este medicamento a otra persona.