



# FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

## ISOSORBIDA DINITRATO

### COMPRIMIDOS 10 mg



Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.

#### Composición:

Cada comprimido contiene:

Isosorbida Dinitrato 10 mg

Excipientes: Almidón Pregelatinizado, Dióxido de Silicio Coloidal, Ácido Esteárico, Lactosa Monohidrato, Celulosa Microcristalina.

#### Clasificación:

Vasodilatador coronario, antianginoso.

#### Indicación:

Profilaxis y tratamiento de angina pectoris y de insuficiencia cardiaca congestiva.

#### Advertencias y Precauciones:

Úsele sólo por indicación y bajo supervisión médica.

- Después de tomar una dosis de este medicamento le puede dar dolor de cabeza que dura un periodo corto de tiempo. Este es un efecto adverso común que desaparece cuando ha tomado el medicamento por un tiempo.
- Mientras esté en tratamiento con este medicamento se debe evitar la ingesta de alcohol.
- Si permanece largos periodos de pie, realiza ejercicios o en días muy calurosos, es más probable que pueden ocurrir mareos o desmayos.
- Administrar con precaución en pacientes con glaucoma.
- La suspensión del tratamiento con Isosorbida Dinitrato debe hacerse en forma gradual.

#### Contraindicaciones:

Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

- Embarazo, lactancia.
- Hipersensibilidad a Isosorbida Dinitrato, Nitroglicerina o a algún componente de la formulación.
- Pacientes con infarto, presión sanguínea marcadamente baja, shock, anemia severa.

#### Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros fármacos o alimentos, con consecuencias dañinas para su organismo, por lo que Ud. debe informar a su Médico si está tomando otros medicamentos, ya sea con o sin receta médica especialmente: antihipertensivos, otros medicamentos cardiacos, Fenotiazinas. No olvide mencionar que Ud. está tomando este medicamento, en caso de requerir atención médica por otras razones, o en caso que se someta a algún examen.

#### Presencia de otras Enfermedades:

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. En caso de sufrir alguna enfermedad Ud. debe consultar al Médico o Farmacéutico antes de ingerir este medicamento, especialmente en los casos siguientes: anemia severa, glaucoma, enfermedad hepática o renal, hipertiroidismo, ataque al corazón reciente, paciente con la presión intracraneana aumentada (trauma en la cabeza, hemorragia cerebral).

#### Efectos Adversos: (no deseados)

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente al Médico si alguno de estos síntomas ocurre: dolor de cabeza severo o prolongado, rash cutáneo, visión borrosa, sequedad de la boca.

Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo: dolor de cabeza, mareos, somnolencia, pulso acelerado, enrojecimiento de cara y cuello, náuseas, vómitos.

#### Forma de Administración:

Vía oral.

#### Dosis:

El Médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada en angina pectoris; es de 5 a 40 mg 3 ó 4 veces al día. En falla cardiaca pueden administrarse dosis por vía oral que varían entre 20 - 40 mg cada 4 horas.

#### Sobredosis:

Son signos o síntomas de sobredosis: labios, uñas o palmas de las manos de color azulado, mareos severos, sensación de presión extrema en la cabeza, respiración corta, cansancio inusual, convulsiones, fiebre. En estos casos, consulte inmediatamente con el Médico. En caso de ingestión involuntaria conduzca inmediatamente al intoxicado a un Centro de Atención Médico.

#### Condiciones de Almacenamiento:

Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 25 °C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO  
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA**

V3  
732944  
29.10.18