



# FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

## NITROFURANTOÍNA

### MACROCRISTALES CÁPSULAS 100 mg



Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.

#### Composición:

Cada cápsula contiene:

Nitrofurantoina Macrocrisales 100 mg

Excipientes: Almidón de Maíz, Almidón Sodio Glicolato, Lauril Sulfato de Sodio, Estearato de Magnesio, Lactosa Monohidrato, Colorante FD&C Azul N° 1, Dióxido de Titanio, Colorante FD&C Amarillo N° 5, Colorante FD&C Rojo N° 40, Gelatina.

#### Clasificación:

Antiséptico urinario.

#### Indicaciones:

Tratamiento de infecciones bacterianas del tracto urinario causadas por gérmenes sensibles, demostrado por urocultivo y antibiograma.

#### Advertencias y Precauciones:

Ud. debe informar a su Médico si ha sufrido alguna reacción inusual o alérgica a la Nitrofurantoina o cualquier otro medicamento antes de usar este fármaco. La administración de este medicamento requiere que su Médico le diagnostique y supervise el curso de su enfermedad (infección urinaria). Es importante que Ud. siga las instrucciones de éste:

- No deje de tomar el medicamento, aún cuando las molestias hayan pasado.
- No intente repetir o mantener el tratamiento por tiempo indefinido.
- Es importante que cumpla con los exámenes indicados, si han sido solicitados.
- Si presenta molestias gástricas o de otro tipo con la toma del medicamento, comuníquelo a su Médico para que le indique otra alternativa.

**Embarazo:** Salvo estricta indicación médica, Nitrofurantoina no debe usarse en el embarazo, particularmente en el embarazo de término.

**Lactancia:** Nitrofurantoina pasa a la leche materna pudiendo causar daño a su bebé. No usar salvo estricta prescripción y supervisión médica.

**Niños:** Según indicación médica, contraindicado en menores de un mes.

**Ancianos:** Administrar con precaución y bajo supervisión médica estricta.

**Otras:** Acuda a su Médico o Farmacéutico ante cualquier duda respecto de la administración, efectos, riesgos o cualquier otro aspecto que Ud. considere importante aclarar o mencionar antes del uso del medicamento.

#### Interacciones:

El efecto de un medicamento puede ser modificado por su administración junto con otros (interacción), por lo que Ud. debe informar a su Médico si está tomando otros medicamentos, especialmente si se trata de antibióticos, hipoglucemiantes, anticoagulantes, etc. En caso de requerir atención médica por otras razones, no olvide mencionar que está tomando este medicamento.

#### Presencia de otras Enfermedades:

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. En caso de sufrir alguna enfermedad Ud. debe mencionársela al Médico antes de ingerir este medicamento, especialmente en los casos siguientes: problemas renales, enfermedad pulmonar, diabetes, daño nervioso.

#### Efectos Adversos (no deseados):

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Cualquier medicamento puede producir efectos no deseados especialmente si se toman por un período prolongado de tiempo y/o en grandes dosis. Si aparecen cualquiera de los síntomas siguientes deje de tomar el medicamento y consulte al Médico: hormigueo o sensación de insensibilidad de las extremidades, problemas respiratorios, dolor de pecho, escalofríos, vómitos, manchas, cambio de color, prurito u otros problemas en la piel, ojos amarillos. Otros efectos son temporales y no requieren atención médica y que desaparecen con el tiempo (adaptación del organismo al medicamento): Náuseas o dolores de estómago. En caso de que persistan o se intensifiquen debe consultar al Médico.

#### Forma de Administración:

Ud. puede tomar este medicamento con algún alimento o leche, para disminuir la posibilidad de malestares estomacales.

#### Dosis:

El Médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada en adultos es de 50-100 mg cuatro veces al día. Niños mayores de 1 año: 5-7 mg / kg de peso 4 veces al día. Tratamiento debe durar al menos una semana.

#### Olvido de una dosis:

Ud. debe tomar su medicamento cuanto antes, excepto si está próximo a la otra dosis, en tal caso sólo debe volver al esquema indicado, sin doblar la dosis.

#### Condiciones de Almacenamiento:

Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad a no más de 25 °C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO  
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA**

V4  
734946  
26.02.18