

FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE

FOLACID® 1 mg

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o químico farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN:

Cada comprimido contiene:

Ácido fólico 1 mg

Excipientes: cs Lactosa monohidrato, Almidón de maíz, Estearato de magnesio, Polividona (K30), Talco, Dióxido de silicio coloidal

INDICACIONES:

Tratamiento y profilaxis de estados deficitarios de ácido fólico, tales como la anemia megaloblástica, anemias de origen nutricional, embarazo, lactancia e infancia.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad (alergia) al ácido fólico.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Antes de usar este medicamento debe sopesarse los riesgos y los beneficios de su uso, los que deben ser discutidos entre usted y su médico. Principalmente debe considerar los aspectos siguientes.

Esta especialidad no está indicada en la prevención de defectos del tubo neural en mujeres con antecedentes de hijos con este defecto. Para estas mujeres se recomiendan dosis

de 4 - 10 mg/día de ácido fólico.

No se debe ingerir más de 1 mg/día de ácido fólico, si no es bajo prescripción médica y descartando antes una anemia por deficiencia de vitamina B12, ya que el ácido fólico puede enmascarar los síntomas de una anemia perniciosa.

Advertencia

En caso de que usted experimente un efecto indeseable que en su opinión ha sido provocado o agravado por el uso de este medicamento, comuníquese a su médico o farmacéutico y solicite que sea reportado a la autoridad sanitaria.

EFFECTOS ADVERSOS: (no deseados)

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica.

Consulte inmediatamente al médico si presenta algunos de los síntomas siguientes:

Raramente pueden aparecer reacciones alérgicas (fiebre, rash cutáneo).

Con la administración de ácido fólico no se han descrito otros efectos adversos más que reacciones de hipersensibilidad incluso a dosis de hasta 10 veces la razón dietética recomendada durante un mes.

Si usted nota cualquier otro efecto molesto no mencionado consulte a su médico.

INTERACCIONES:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Usted debe comunicar a su médico de todos los medicamentos que está

tomando ya sea con o sin receta médica antes de usar este fármaco.

El ácido fólico puede presentar interacciones con:

Antagonistas del ácido fólico (metotrexato, trimetoprim), antiepilépticos, estrógenos, sul-

famidas (sulfas), corticosteroides (por ej. prednisona, betametasona, cortisona, etc.) y alcohol.

Las necesidades de ácido fólico pueden aumentar en los pacientes a los que se administra alguno de estos medicamentos.

La administración de ácido fólico con antiepilépticos del grupo de la hidantoínas (por ej. fenitoína) puede disminuir los efectos de estos últimos.

SOBREDOSIFICACIÓN:

FOLACID comprimidos 1 mg, a dosis usuales, es bien tolerado por el organismo, no existiendo la posibilidad de intoxicación aguda, crónica ó accidental.

Dosis muy superiores de ácido fólico a las de esta especialidad son bien toleradas, por lo que no es de temer intoxicación incluso por ingestión masiva accidental.

Embarazo y Lactancia:

La deficiencia de ácido fólico durante el embarazo es un problema común en mujeres mal nutridas y que no reciben suplementación.

Se ha demostrado que la deficiencia de ácido fólico da lugar a anomalías congénitas, defectos del tubo neural, abortos espontáneos y otras complicaciones.

Por ello, la mujer embarazada debe recibir cantidades suficientes de ácido fólico en la dieta o mediante suplementación.

El ácido fólico se excreta en la leche materna. Durante la lactancia los requerimientos de ácido fólico están aumentados. El consumo de ácido fólico es compatible con la lactancia.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular, no obstante, la dosis usual recomendada es de 0,4 mg diarios por vía oral, comenzando al menos un mes antes de la gestación y continuando el tratamiento durante el primer trimestre del embarazo. Esta dosis aumenta a 0,8 mg diarios cuando existen estados que producen un aumento de las necesidades.

Este suplemento debe iniciarse desde el momento que se planifica un embarazo: cuando se abandona el método anticonceptivo o se inician relaciones sexuales sin método anticonceptivo.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:


Mantener lejos del alcance y de la vista de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 25 °C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Presentación:

Envase con 30 comprimidos de 1 mg de ácido fólico.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACIÓN MEDICA
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA**



Av. Cerro El Plomo 5420, Las Condes
Tel.: 2 2656 7800
www.itf-labomed.cl