

# FOLACID® 5 mg

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

## COMPOSICION Y PRESENTACION:

Cada comprimido contiene:

Acido Fólico 5 mg

Excipientes: Lactosa monohidrato, Almidón de maíz, Estearato de magnesio, Polividona, Taico, Dióxido de silicio coloidal.

Vía de Administración: Oral

Presentación: Envase con 30 Comprimidos.

## CLASIFICACION:

Suplemento vitamínico.

## INDICACIONES:

Profilaxis de defectos en el tubo neural (espinas bifidas, anencefalia, encetalocete) en mujeres con antecedentes de hijo o feto con deficiencia en el tubo neural.

Tratamiento de los niveles anormalmente elevados de homocisteína total en plasma. Este medicamento debe ser usado sólo por indicación de su médico.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Antes de usar este medicamento debe sopesarse los riesgos y los beneficios de su uso, los que deben ser discutidos entre usted y su médico. Principalmente debe considerar los aspectos siguientes.

### a. Alergias

Usted debe comunicar a su médico si alguna vez ha presentado una reacción alérgica a este medicamento o a alguna otra sustancia, ya sean alimentos, preservantes, colorantes, saborizantes u otros medicamentos.

### b. Lactancia

Usted debe conversar con el médico acerca de la conveniencia del uso de este producto mientras esté amamantando.

### c. Niños

La dosis de ácido fólico que contiene este medicamento no es apropiada para su uso en niños.

### d. Ancianos

No se han reportado problemas con la ingesta de las dosis normalmente recomendadas de ácido fólico. Consulte a su médico.

### e. Este medicamento contiene lactosa.

Se han descrito casos de intolerancia a este componente en niños y adolescentes. Aunque la cantidad de lactosa que contiene es pequeña, se debe consultar al médico si se presenta diarrea.

### Advertencia

En caso de que usted experimente un efecto indeseable que en su opinión ha sido provocado o agravado por el uso de este medicamento, comuníquese a su médico o farmacéutico y solicite que sea reportado a la autoridad sanitaria.

## INTERACCIONES:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Usted debe comunicar a su médico de todos los medicamentos que está tomando ya sea con o sin receta médica antes de usar este fármaco. Se han descrito interacciones con los siguientes medicamentos: Fenitofina, carbamazepina, anticonceptivos orales, analgésicos, antiácidos, metotrexato, pirimetamina, triamtereno, trimetoprim, sulfonamidas.

## PRESENCIA DE OTRAS ENFERMEDADES:

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. Usted debe comunicar a su médico si padece de alguna enfermedad, principalmente en los casos siguientes: Anemia perniciosa.

## EFFECTOS ADVERSOS: (no deseados)

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica.

## Consulte inmediatamente al médico si presenta algunos de los síntomas siguientes:

Raramente puede presentarse fiebre, enrojecimiento, picazón o erupción de la piel, respiración entrecortada, jadeo.

**Si usted nota cualquier otro efecto molesto no mencionado consulte a su médico.**

## FORMA DE ADMINISTRACION:

Use este medicamento siguiendo las instrucciones de uso, no use más o con mayor frecuencia de la que su médico le indique.

### Posología:

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

### Prevención y tratamiento de estados carenciales y anemias megaloblásticas por deficiencia de folatos:

1 a 2 comprimidos diarios en 1 - 2 tomas al día.

### Prevención de defectos del tubo neural:

1 a 2 comprimidos al día durante cuatro semanas antes de la concepción y los tres primeros meses de gestación.

### Hiperhomocisteinemia:

1 comprimido al día hasta que la concentración de homocisteína descienda al nivel deseado. En algunos casos puede ser necesario aumentar la dosis a 10 - 15 mg/día para conseguir que las concentraciones de homocisteína se sitúen dentro del rango considerado normal (5-10 µg/L).

Preferentemente administrar antes de las comidas.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener lejos del alcance y de la vista de los niños, mantener en su envase original, protegido de calor, luz y humedad, a no más de 25 °C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO.  
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.**



Av. Cerro El Plomo 5420, Las Condes  
Tel.: 2 2658 7800  
www.itf-labomed.cl