













Piano trattamenti Matasci - 2024

stadio	prodotto	azienda	dose	alternativa	indicazioni
	HELIOSOUFRE S	OMYA	16 LT/HA	THIOVIT JET 16 KG/HA (SYNGENTA)	SOLO SE NECESSARIO
	FOLPET 80 WDG HELIOSOUFRE S	SYNGENTA OMYA	1.2 KG/HA 3.0 LT/HA	PHALTAN 80 WDG 1.2 KG/HA (OMYA) THIOVIT JET 3 KG/HA (SYNGENTA)	
	1 RIDOMIL VINO RONDO SKY	SYNGENTA SYNGENTA	2.25 KG/HA 0.15 LT/HA	ARCO 2 KG/HA (OMYA) VIVANDO 0.2 LT/HA (SYNGENTA) O ALITON 0.2 LT/HA (OMYA)	AGGIUNGERE HELIOSOUFRE S NELLE ZONE SOGGETTE ALL'OIDIO IN CASO DI BLACK ROT UTILIZZARE NOREC A 2.5LT/HA AL POSTO DI RIDOMIL E/O ARCO
	2 RIDOMIL VINO TOPAS VINO	SYNGENTA SYNGENTA	2.7 KG/HA 0.3 LT/HA	ARCO 2 KG/HA (OMYA) RONDO SKY 0.15 LT/HA (SYNGENTA)	AGGIUNGERE HELIOSOUFRE S NELLE ZONE SOGGETTE ALL'OIDIO *VIVANDO E ALITON NON OLTRE LA FIORITURA
	3 PERGADO TOPAS VINO HELIOSOUFRE S	SYNGENTA SYNGENTA OMYA	3.2 KG/HA 0.3 LT/HA 2 LT/HA	DOMINATOR 1.2 KG/HA (OMYA)*	PERGADO O DOMINATOR SOLO IN QUESTO SINGOLO TRATTAMENTO E NON OLTRE IL 15 GIUGNO!
	4 CYRANO* TALENDO HELIOSOUFRE S	SYNGENTA STAHLER OMYA	3.2 KG/HA 0.4 LT/HA 2 LT/HA	STAMINA S 3 LT/HA + FOLPET 1.2 KG/HA (STAHLER)	*NON UTILIZZARE PRODOTTI RAMEICI CON CYRANO. IN CASO DI FORTE PRESSIONE DI PERONOSPORA, STRINGERE GLI INTERVALLI
	5 MILDICUT CUPROFIX FLUID TOPAS VINO	BAYER SYNGENTA SYNGENTA	4 LT/HA 1.2 LT/HA 0.4 LT/HA	LEMAY 0.36 LT/HA (STAHLER) FUNGURAN FLOW 1.2 LT/HA (OMYA)	IN CASO DI FORTE PRESSIONE DI PERONOSPORA, STRINGERE GLI INTERVALLI
	6 CYRANO* TALENDO HELIOSOUFRE S	SYNGENTA STAHLER OMYA	3.2 KG/HA 0.4 LT/HA 2 LT/HA	STAMINA S 3 LT/HA + FOLPET 1.2 KG/HA (STAHLER)	*NON UTILIZZARE PRODOTTI RAMEICI CON CYRANO
	7 MILDICUT CUPROFIX FLUID PICAN	BAYER SYNGENTA OMYA	4 LT/HA 1.2 LT/HA 0.48 LT/HA	LEMAY 0.36 LT/HA (STAHLER) FUNGURAN FLOW 1.2 LT/HA (OMYA) CYFLAMID 0.48 LT/HA (STAHLER)	
	8 PROLECTUS CUPROFIX FLUID	OMYA SYNGENTA	1.2 KG/HA 1.5 LT/HA	FRUPICA 1.2 LT/HA (STAHLER)* FUNGURAN FLOW 1.5 LT/HA (OMYA)	PER VARIETA' MERLOT, PROLECTUS O FRUPICA DA UTILIZZARE ENTRO META' LUGLIO!!! *IN ALTERNATIVA A PROLECTUS, UTILIZZARE FRUPICA (1.2 LT/HA) SE ZONA POCO SOGGETTA A BOTRYTIS O SE STAGIONE FAVOREVOLE
	9 AMALINE FLOW PICAN	SYNGENTA OMYA	2.8 LT/HA 0.48 LT/HA	ESCORT 0.45 KG/HA (OMYA) CYFLAMID 0.48 LT/HA (STAHLER)	IN CASO DI GRANDINE TRATTARE CON PHALTAN 80WDG 2.4 KG/HA ENTRO 18 ORE DALLA GRANDINATA
	10 CUPROFIX FLUID HELIOSOUFRE S	SYNGENTA OMYA	2 LT/HA 5 LT/HA	FUNGURAN FLOW 2 LT/HA (OMYA)	TRATTAMENTO DA EFFETTUARE ENTRO META' AGOSTO
Fine agosto	CUPROFIX FLUID	SYNGENTA	2 LT/HA	FUNGURAN FLOW 2 LT/HA (OMYA)	SOLO FEMMINELLE - RAME AL PIU' TARDI ENTRO FINE AGOSTO