


TAK FORDI DU BRUGER NEMATODER TIL BIOLOGISK BEKÆMPELSE

A close-up photograph of a green watering nozzle spraying water in a fan shape. The water droplets are in sharp focus, creating a misty effect. The background consists of out-of-focus green foliage.

Bliv fri for
sørgemyg,
øresnudebiller,
gåsebiller, myrer
samt skadedyr i
frugt og grønt med
nematoder

SÅDAN FÅR DU STØRST GLÆDE AF NEMATODERNE

Følg vores råd og få større glæde af nematoderne:

- Opbevar nematoderne koldt (4 - 8° C) indtil du skal bruge dem. Hold øje med udløbsdatoen på pakken og brug dem helst hurtigst muligt efter modtagelse.
- Vand/sprøjt aldrig nematoderne ud i direkte sollys. Du kan med fordel gøre det morgen eller aften.
- Nematoderne bruger vandet i jorden til at finde et værtsdyr. Det er derfor vigtigt, at nematoderne er i et fugtigt miljø både før, under og efter at du har vandet eller sprøjtet nematoderne ud. Der må ikke være så meget vand, at der er små vandpytter. Hold jorden fugtig i mindst et par uger efter at du har vandet dem ud.
- Brug nematoderne inden for 4 timer, når de er blandet op i vand.
- Har du for mange nematoder? Så kan du bruge hele pakken på et mindre område - du kan ikke overdosere.

BRUGSANVISNING TIL NEMATODER

Læs hele brugsanvisningen, inden du bruger nematoderne. Vander du nematoderne ud med NemaSprayer, skal du følge vejledningen, som fulgte med sprayeren.

1. Lav en grundblanding

Bland hele pakken med nematoder i 1 liter vand. Brug et målebæger/skål til at lave grundblandingen - brug ikke vandkanden. Rør grundigt, så nematoderne er fordelt i vandet og rør derefter hvert 15. minut, indtil hele blandingen er brugt.

Vander du nematoderne ud med vandkande, skal du bruge et brusehoved, hvor hullerne er min 0,5 mm (brusehoved er ikke nødvendigt ved vanding i potteplanter).

2. Bland grundblandingen op med vand

Tag en del af grundblandingen jf tabellen nedenfor og bland op med vand.

Rækker op til (antal nematoder)	Bland 1 liter grundblanding op med vand jf nedenfor
10 m ² (5 mio. nematoder)	10 liter
20 m ² (10 mio. nematoder)	20 liter
50 m ² (25 mio. nematoder)	50 liter
100 m ² (50 mio. nematoder)	100 liter

3. Vand eller sprøjt nematoderne ud

Vand nematoderne ud på området. Følg også anvisningen på de følgende sider.

SØRGEMYG

Sørgemyg bekæmpes med *Steinernema feltiae* (F) nematoder.



Følg brugsanvisningen for opblanding og vand nematoderne ud. Vær opmærksom på ikke at overvande potteplanter: Brug evt. mindre vand med samme mængde nematoder - du kan ikke overdosere. Når du har vandet nematoderne ud, vil de første larver af sørgemyg være bekæmpet efter en enkelt dag. Efter 2-3 uger, er den kommende generation af sørgemyg bekæmpet.

Vi anbefaler, at du vander nematoderne ud i alle dine planter - også selvom der ikke er synlige sørgemyg eller larver af sørgemyg. Jordtemperaturen skal være 8° - 28° C.

Er der mange voksne sørgemyg, så er der helt sikkert også mange larver af sørgemyg og du kan med fordel gentage vanding med nye nematoder efter et par uger.

TIP: Reducer antallet af voksne sørgemyg ved at sætte en ECOstyle fangstplade op samtidig med udvanding af nematoder.

ØRESNUDEBILLER

Nematoder mod larver af øresnudebiller

Larver af øresnudebiller bekæmpes med *Heterorhabditis bacteriophora* (H) nematoder fra starten af maj til midt i juni og igen fra midt i august til slut september.



Følg brugsanvisningen for opblanding og vand nematoderne ud ved en jordtemperatur på 12° - 30° C. Når du har vandet nematoderne ud, vil du efter 2-3 uger se døde rød-brune larver i jorden og den kommende generation af øresnudebiller er nu bekæmpet.

Nematoder mod voksne øresnudebiller

Øresnudebiller bekæmpes med fælden fra maj-september. Fjern folien fra fælden og sæt en fælde for hver 10 m² eller 5 meter hæk på steder, hvor der er mange voksne øresnudebiller. Det er typisk tæt på rodhalsen af planten eller i områder, hvor der er mange billetklip. Fælden skal vende med rillerne nedad og skal stå i skygge. Billerne søger ly i fældens riller, hvor der er en gel med nematoder.

Nematoderne bekæmper nu billerne, uden at du behøver at gøre mere. Vær opmærksom på holdbarhedsdatoen på pakken. Når fælden er sat ud, er nematoderne aktive i mindst 6 uger.

GÅSEBILLER

Larver af gåsebiller bekæmpes med *Heterorhabditis bacteriophora* (H) nematoder fra slutningen af juli til midt i september.



Inden du vander med nematoder kan du med fordel klippe græsset så kort som muligt, så nematoderne har nemmere ved at trænge ned i jorden til larverne.

Følg brugsanvisningen for opblanding og vand nematoderne ud ved en jordtemperatur på 15° - 25° C. Det er meget vigtigt, at jorden er fugtig inden udvanding samt i ugerne efter udvandingen. Efter 3-4 uger vil du kunne se døde rød-brune larver i jorden og den kommende generation af gåsebiller er nu bekæmpet.

MYRER

Myrer og myrebo flyttes med *Steinernema feltiae* (F) nematoder.



Følg brugsanvisningen for opblanding og vand nematoderne ud ved en jordtemperatur på 12° - 30° C. Bemærk, at nematoder mod myrer egner sig til myrer i fx drivhuset, køkkenhaven, blomsterbede og græsplænen. De egner sig ikke til myrer i fliser. 1 mio. nematoder rækker ca. til 1 myrebo, men det afhænger naturligvis af myreboets størrelse.

SKADEDYR I FRUGT OG GRØNT



Skadedyr i frugt og grønt bekæmpes med *Steinernema* spp. (FC) nematoder.

Nematoder mod larver af gulerods-, kål-, løgfluer, knoporme

Du får det bedste resultat, hvis du vander med nematoder tidligt på sæsonen og gerne allerede når der er fare for at afgrøderne bliver skadet. Har du tidligere haft skadedyr i afgrøderne, anbefaler vi at du vander nematoder ud hver 14. dag i sæsonen for at fange kommende generationer.

Følg brugsanvisningen for opblanding og vand nematoderne ud ved en jordtemperatur på 12° - 30 C. Efter 2-3 uger vil du se døde larver i jorden og den kommende generation er nu bekæmpet.

Nematoder mod larver, stikkelsbærbladhveps og trips

Larver på planter, stikkelsbærbladhveps og trips kan være svære at blive fri for med biologisk bekæmpelse. Nematoder er ingen undtagelse og for at få det bedste resultat anbefaler vi, at du sprøjter dem ud med fx en tryksprøjte uden filter og ved lavt tryk.

Gør planten våd, inden du starter. Følg brugsanvisningen for opblanding og tag her-efter en del af grundblandingen og hæld den over i din tryksprøjte. Fyld sprøjten op med rent vand og rør grundigt.

Du skal nu sprøjte nematoderne ud direkte på skadedyrene. Sprøjt både på over- og undersiden af bladene, hvor der er skadedyr. Gentag, indtil du har brugt hele grundblandingen. En pakke med 10 mio nematoder rækker op til 60 m². Du kan ikke overdosere.



@ecostyledanmark
www.ecostyle.dk