



So funktioniert der Booster

Der Vakuum-Unterdruck wird verwendet, um den Penis zu verstopfen und aufzurichten, die Durchblutung des Penis zu beschleunigen, die schnelle Hyperämie des Schwellkörpers des Penis zu fördern, den Penis schnell aufzurichten und die Wirkung der vorübergehenden Vergrößerung des Penis ist offensichtlich .

Schritte zur Verwendung

- 1) Bevor Sie die Penispumpe verwenden, massieren Sie den Penis sanft oder verwenden Sie eine Wärmflasche, um ihn richtig zu erhitzen, damit er 1/2-3/4 erigiert wird.
- 2) Stellen Sie sicher, dass Ihr Penis und Kopf gut geschmiert sind, um mögliche Reibung zu vermeiden, wenn der Penis beim Aufblasen im Zylinder hängen bleibt.
- 3) Der Penis wird dann in die transparente Zylinderkammer eingeführt, um eine luftdichte Abdichtung zwischen der Penisbasis und der Zylinderkammer zu gewährleisten. Dann wird mit sanften und allmählichen Pumpbewegungen Luft aus der Kammer gesaugt, wodurch ein Vakuum in der Kammer entsteht.
- 4) Ihr Penis sollte nach Beendigung Ihres Trainings merklich größer aussehen, die erweiternden Effekte sind jedoch größtenteils vorübergehend und im Wesentlichen auf die ersten 8 bis 10 Stunden beschränkt (abhängig von der Intensität Ihres Trainings).
- 5) Erektion Nachdem Sie die Penispumpe entfernt haben, können Sie eine Spermien Sperre an der Penisschwanzwurzel anbringen, um den Penis prall zu halten und eine Erektion aufrechtzuerhalten. (Achtung: Verwenden Sie eine Samensperre niemals länger als 30 Minuten, da eine längere Unterbrechung des Blutflusses Ihren Penis schädigen kann.)
- 6) Normalerweise können Sie eine Penispumpe einmal täglich für 10-15 Minuten trainieren.

Vorsicht

- !** Obwohl Penispumpen für die meisten Männer sicher sind, gibt es einige potenzielle Risiken. Zum Beispiel :
1. Das Blutungsrisiko ist bei Einnahme von Hämodilutionsmitteln erhöht. Beispiele sind Warfarin (Coumadin, Jantoven) und Clopidogrel (Plavix).
 2. Wenn Sie an Sichelzellenanämie oder anderen Bluterkrankungen leiden, kann die Verwendung einer Penispumpe möglicherweise nicht garantiert werden. Diese Bedingungen können Sie anfällig für Blutgerinnsel oder Blutungen machen.
- !** Verwenden Sie keine Penispumpe, wenn Sie ähnliche Medikamente einnehmen oder an ähnlichen Erkrankungen leiden, oder konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie sie verwenden.
3. Mehr Druck ist nicht immer besser und das Anwenden von zu viel Druck kann zu den folgenden Zuständen führen, ist aber nicht darauf beschränkt.
Hautflecken / geplatzte Blutgefäße / geplatzte Kapillaren und Blasen / geplatzte Venen
Hören Sie sofort auf, das Produkt zu verwenden, wenn Sie sich unwohl fühlen.

Kundendienst

service@acmejoy.de



Principe de fonctionnement de Pompe à pénis

L'utilisation de la pression négative du vacuum provoque la congestion du pénis, accélère la circulation sanguine du pénis, incite le corps spongieux du pénis à se congestionner rapidement, obtenant une érection rapide du pénis, et l'effet évident de l'agrandissement temporaire du pénis. Une utilisation régulière et constante permet un effet bénéfique sur l'élargissement et le durcissement du pénis.

Étapes d'utilisation

- 1) Avant d'utiliser la pompe à pénis, massez doucement ou utilisez un sac d'eau chaude pour chauffer adéquatement le pénis afin qu'il soit en érection de 1/2 à 3/4.
- 2) Veillez à ce que l'ensemble du pénis, y compris la tête, soit bien lubrifié afin d'éviter tout frottement possible lorsque le pénis est serré à l'intérieur de la pompe à pénis pendant qu'il se dilate.
- 3) Insérez le pénis dans la pompe, assurez une étanchéité entre la base du pénis et l'entrée de la pompe. L'air est ensuite aspiré hors de la chambre par une action de pompage douce et progressive, faisant ainsi un vide à l'intérieur de la chambre.
- 4) Après avoir terminé l'exercice, votre pénis devrait paraître nettement plus grand, mais l'effet d'expansion est en grande partie temporaire et limité aux 8 à 10 premières heures (en fonction de l'intensité de l'exercice).
- 5) Après, retirez la pompe à pénis, vous pouvez appliquer un cockring au pénis pour aider à le maintenir engorgé de sang et à maintenir une érection. (Remarque : n'utilisez pas l'anneau pendant plus de 30 minutes, car la circulation sanguine pourrait être interrompue trop longtemps et votre pénis pourrait être endommagé).
- 6) En règle générale, vous pouvez utiliser la pompe à pénis une fois par jour pendant 10 à 15 minutes.

A noter

- !** Bien que les pompes à pénis soient sûres pour la plupart des hommes, il existe certains risques potentiels. Par exemple :
1. Le risque d'hémorragie est accru en cas de prise de médicaments hémodilutions. Les exemples incluent la warfarine (Coumadin, Jantoven) et le clopidogrel (Plavix).
 2. Si vous souffrez d'anémie falciforme ou d'autres troubles sanguins, l'utilisation d'une pompe à pénis peut ne pas être garantie. Ces affections peuvent vous rendre vulnérable aux caillots sanguins ou aux hémorragies.
- !** N'utilisez pas une pompe à pénis si vous prenez des médicaments similaires ou si vous souffrez d'une maladie similaire, ou consultez votre médecin avant de l'utiliser.
3. plus de pression n'est pas toujours mieux et l'application d'une pression trop forte peut provoquer, sans s'y limiter, les conditions suivantes.
Taches cutanées / rupture de vaisseaux sanguins / rupture de capillaires et cloques / rupture de veines
Cessez immédiatement d'utiliser le produit en cas d'inconfort.

Service après-vente

service@acmejoy.de



Het werkingsprincipe van het uitbreidingsapparaat

Het gebruik van negatieve vacuümdruk zorgt ervoor dat de penis volloopt met bloed, versnelt de bloedsomloop van de penis, zet het sponsachtige lichaam van de penis aan om zich snel met bloed te vullen, waardoor de penis snel stijf wordt, het tijdelijke effect van de penisuitbreiding is duidelijk, regelmatige naleving van het gebruik heeft een zeker effect op de uitbreiding en verharding van de penis.

Gebruiksaanwijzing

- 1) Voordat u de penis pomp gebruikt, masseert u zachtjes of gebruikt u een warmwaterzak om de penis goed te verwarmen om hem 1/2-3/4 stijf te maken.
- 2) Zorg ervoor dat de hele penis en de kop goed zijn ingevet om mogelijke wrijving te voorkomen wanneer de penis aan de binnenkant van de cilinder wordt geklemd terwijl deze uitzet.
- 3) De penis wordt vervolgens in de doorzichtige cilinderkamer geschoven om een luchtdichte afsluiting tussen de basis van de penis en de cilinderkamer te verzekeren. Vervolgens wordt de lucht uit de kamer gezogen door zachtjes en geleidelijk te pompen, waardoor een vacuüm in de kamer ontstaat.
- 4) Na afloop van de oefening zou uw penis er aanzienlijk groter uit moeten zien, maar het expansie-effect is grotendeels tijdelijk en in wezen beperkt tot de eerste 8 tot 10 uur (afhankelijk van de intensiteit van de oefening).
- 5) Na het verwijderen van de penis pomp voor de erectie, kunt u een borgring aanbrengen aan de basis van de penis om te helpen de penis gezwollen te houden en een erectie te behouden. (Opmerking: Gebruik de ring niet langer dan 30 minuten, omdat de bloedstroom te lang onderbroken kan worden en uw penis beschadigd kan raken).
- 6) Als algemene regel kunt u de penis pomp één keer per dag gedurende 10-15 minuten per keer gebruiken.

Let op

- !** Hoewel penis pompen veilig zijn voor de meeste mannen, zijn er enkele potentiële risico's. Bijvoorbeeld :
1. Het risico op bloedingen is verhoogd bij gebruik van bloedverdunnende medicijnen. Voorbeelden hiervan zijn warfarine (Coumadin, Jantoven) en clopidogrel (Plavix).
 2. Als u sikkelcelanemie of andere bloedaandoeningen hebt, is een penis pomp mogelijk niet gegarandeerd veilig. Deze aandoeningen kunnen u vatbaar maken voor bloedstolsels of bloedingen.
- !** Gebruik geen penis pomp als u soortgelijke medicijnen gebruikt of een soortgelijke ziekte heeft, of raadpleeg uw arts voordat u de pomp gebruikt.
3. Meer druk is niet altijd beter en te veel druk uitoefenen kan de volgende aandoeningen veroorzaken :
Huidvlekken / gebroken bloedvaten / kapotte haarvaten en blaren / gebroken aderen.
Stop onmiddellijk met het gebruik als er ongemak ontstaat.

Dienst na verkoop

service@acmejoy.de



Cómo funcionan los refuerzos

Use presión negativa al vacío para hacer que el pene se erija con estreñimiento, acelere la circulación sanguínea del pene, promueva la rápida hiperemia del tejido eréctil del pene, haga que el pene se erija rápidamente y aumente temporalmente el efecto del pene.

Pasos para el uso

- 1) Antes de usar la bomba para el pene, masajee suavemente o use una botella de agua caliente para calentar adecuadamente el pene y lograr que esté erecto entre 1/2 y 3/4.
- 2) Asegúrese de que su pene y glande estén bien lubricados para evitar posibles fricciones si el pene queda atrapado dentro del cilindro mientras se infla.
- 3) Luego, el pene se inserta en la cámara del cilindro transparente para asegurar un sello hermético entre la base del pene y la cámara del cilindro. Luego se extrae aire de la cámara con movimientos de bombeo suaves y graduales, creando un vacío dentro de la cámara.
- 4) Su pene debería verse notablemente más grande después de terminar su entrenamiento, sin embargo, los efectos de dilatación son en gran parte temporales y se limitan esencialmente a las primeras 8 a 10 horas (dependiendo de la intensidad de su entrenamiento).
- 5) Erección Después de retirar la bomba del pene, puede colocar un bloqueo de esperma en la base del pene para ayudar a mantener el pene congestionado y mantener una erección. (Precaución: nunca use un bloqueo de esperma durante más de 30 minutos, ya que la interrupción prolongada del flujo sanguíneo puede dañar su pene).

Anotar

- !** Aunque las bombas de pene son seguras para la mayoría de los hombres, existen algunos riesgos potenciales. Por ejemplo :
1. El riesgo de hemorragia aumenta cuando se toman medicamentos de hemodilución. Los ejemplos incluyen warfarina (Coumadin, Jantoven) y clopidogrel (Plavix).
 2. Si tiene anemia de células falciformes u otros trastornos de la sangre, es posible que no se garantice el uso de una bomba para el pene. Estas condiciones pueden hacerlo vulnerable a coágulos de sangre o sangrado.
- !** No use una bomba de pene si está tomando medicamentos similares o tiene una condición médica similar, o consulte a su médico antes de usarla.
3. Más presión no siempre es mejor y aplicar demasiada presión puede causar, entre otras, las siguientes condiciones. Manchas en la piel / ruptura de vasos sanguíneos / ruptura de capilares y ampollas / ruptura de venas
Deje de usar el producto inmediatamente si siente alguna molestia.

Servicio postventa

service@acmejoy.de