

Cistite in età pediatrica

Segui il percorso guidato cliccando sul bottone colorato



Fase acuta

Fase di mantenimento
e prevenzione

Consigli utili

Si ringraziano gli sponsor che consentono a Cistite.info APS di portare avanti la ricerca, dare un aiuto concreto alle donne in difficoltà, organizzare eventi, mantenere in vita il sito e i nostri social e sostenere le spese di gestione dell'associazione. Senza il sostegno degli sponsor tutto ciò non sarebbe possibile. Scegliamo esclusivamente i partner in linea con i nostri principi e la nostra etica e i cui prodotti o servizi si siano rivelati realmente utili, sicuri ed efficaci su un cospicuo numero di soci.

Hai bisogno di aiuto?
Contattaci tramite
la chat sul [sito](#).



DR. TILI
rimedi

 **Puro**
Per la tua salute intima



CISTITE.INFO APS





Fase acuta

Se il bambino pesa meno di 25 kg dimezzare la dose

Cura orale

Cura locale

calore

Esami

urinocultura e stick urine





N.B. Se il bambino pesa meno di 25 kg dimezzare le dosi

prima settimana							seconda settimana						
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7

Puroman D-Mannosio Pediatrico*

Sciroppo a base di D-mannosio arricchito, gusto gradevole ai bambini - Dose misurata in ml

ore 7.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ore 10.00	5	5	5	5	5	5	5							
ore 11.00								5	5	5	5	5	5	5
ore 13.00	5	5	5	5	5	5	5							
ore 15.00								5	5	5	5	5	5	5
ore 16.00	5	5	5	5	5	5	5							
ore 17.00														
ore 19.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ore 22.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
notte (se ci si sveglia)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)							

Regobasic (alcalinizzante)

Da usare in SOLO caso di ph inferiore a 6 (segui lo schema dell'[esame stick urine](#))

mattina	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
sera	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

*Modalità di assunzione D-Mannosio:

- La dose quotidiana (tranne quella delle 22) può essere diluita in 1 litro d'acqua da bere durante il giorno. L'efficacia non cambia.
- Scalare il dosaggio la settimana successiva solo se i sintomi migliorano.
- Di notte somministrare una dose solo se il bambino si sveglia.



Cura locale - fase acuta

Clicca sulla barra della procedura per altre informazioni



prima settimana

seconda settimana

1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Calore

mattina	•	•	•	•	(•)	(•)	(•)	(al bisogno)					
pomeriggio	•	•	•	(•)	(•)	(•)	(•)						
sera	•	•	•	•	•	•	(•)						



Esami - fase acuta

Clicca sulla barra dell'esame per altre informazioni



prima settimana

seconda settimana

1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Urinocultura

mattina

•														•
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Stick urine

mattina

•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	--	---	--	--



Fase di mantenimento e prevenzione

se il bambino pesa meno di di 25kg dimezzare le dosi

Cura orale

Cura locale

calore

Esami

urinocultura e stick urine





Cura orale - fase di mantenimento

Clicca sulla barra del prodotto per altre informazioni



N.B. Se il bambino pesa meno di 25 kg dimezzare le dosi

1° e 2° settimana							3° e 4° settimana							5° e 6° settimana							7° e 8° settimana						
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7

Puroman D-Mannosio Pediatrico*

Sciroppo a base di D-mannosio arricchito, gusto gradevole ai bambini - Dose misurata in ml

ore 7.00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
ore 15.00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													
ore 23.00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Regobasic (alcalinizzante)

Da usare SOLO in caso di ph inferiore a 6 (segui lo schema dell'[esame stick urine](#))

mattina	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
sera	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

*Modalità di assunzione D-Mannosio:

- La dose quotidiana (tranne quella delle 22) può essere diluita in 1 litro d'acqua da bere durante il giorno. L'efficacia non cambia.
- Scalare solo se l'[urinocoltura](#) è negativa
- Di notte somministrare una dose solo se il bambino si sveglia.



Cura locale - fase di mantenimento

Clicca sulla barra verde sottostante per altre informazioni



	1° e 2° settimana							3° e 4° settimana							5° e 6° settimana							7° e 8° settimana						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
Calore																												
mattina	•	•	•	•	(•)	(•)	(•)	•	•	•	•	(•)	(•)	(•)	•	•	•	•	(•)	(•)	(•)	•	•	•	•	(•)	(•)	(•)
pomeriggio	•	•	•	(•)	(•)	(•)	(•)	•	•	•	(•)	(•)	(•)	(•)	•	•	•	(•)	(•)	(•)	(•)	•	•	•	(•)	(•)	(•)	(•)
sera	•	•	•	•	•	•	(•)	•	•	•	•	•	•	(•)	•	•	•	•	•	•	(•)	•	•	•	•	•	•	(•)

Eeguire la procedura SOLO se se ne sente il bisogno



Esami - fase di mantenimento

Clicca sulla barra dell'esame per altre informazioni



	1° e 2° settimana							3° e 4° settimana							5° e 6° settimana							7° e 8° settimana								
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
Stick urine																														
mattina	•			•			•			•				•								•								•

	1° settimana							2° settimana							3° settimana							4° settimana													
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7							
Urinocultura																																			
mattina																																			

	5° settimana							6° settimana							7° settimana							8° settimana												
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7						
mattina	•	se negativo diminuire dosi																										se negativo sospendere						•



Consigli utili

Sì!

- Bere poco e spesso (50 ml ogni 20 minuti circa)
- Se dagli esami risultano batteri Proteus, Providencia, Pseudomonas o Morganella acidificare le urine con la dieta (mirtilli, proteine e carboidrati) o acidificanti pediatrici.
- Gli orari di assunzione sono indicativi. Adattarli alle abitudini del bambino (sveglia, pasti e addormentamento)
- Nelle bambine valutare l'aspetto dei genitali esterni: se arrossati applicare mattina e sera sulla vulva un sottile strato di crema lenitiva/protettiva ([Vitamina E spray](#), [Allantoina](#), [Pantenolo](#), [olio di mandorle](#)).

No!

- Trattenere le urine per più di 4 ore durante il giorno

ATTENZIONE! I consigli riportati sono il frutto di un costante confronto tra donne affette da patologie urogenitali, che in nessun caso vogliono e possono sostituire la prescrizione di un trattamento o il rapporto diretto con il proprio medico curante. Si raccomanda pertanto di chiedere il parere del proprio medico prima di mettere in pratica qualsiasi consiglio o indicazione riportata.

