

TABLEAU DE DOSAGE PAR CULTURE



CULTURE	MALADIES	DOSES POUR 1 L D'EAU	PÉRIODE D'UTILISATION
Pomme de terre	Mildiou	25 g pour 10 m ²	Dès la levée, puis tous les 10 jours en cas de pluie après le traitement.
Tomate	Mildiou, Bactérioses	6.25 g pour 10 m ² 20 g pour 10 m ²	En traitement préventif dès la plantation, puis tous les 10 à 12 jours à partir du mois de juin et juillet.
Fraisier	Bactérioses	12.5 g pour 10 m ²	Avril et après la récolte
Vigne	Mildiou	15 g pour 10 m ²	Tous les 10 à 15 jours à partir du mois de mai.
Pêcher	Cloque	25 g	En fin d'hiver, pendant l'apparition des bourgeons. Pendant la chute des feuilles
	Bactérioses	6.25 g	
Poirier, Pommier	Tavelure	12.5 g	Au gonflement des bourgeons et avant floraison. A la chute des feuilles A la chute des feuilles
	Bactérioses	12.5 g	
	Chancre européen	25 g	
Fruits à coque (noyer, noisetier)	Bactérioses	12.5 g	Mai et juin
Abricotier	Coryneum Bactérioses	12.5 g	Après la chute des feuilles
Cerisier	Coryneum, Bactérioses	12.5 g	Après la chute des feuilles
Scarole, frisée	Bactérioses	12.5 g pour 10 m ²	-
Olivier	Maladie de l'oeil du paon, Bactérioses	12.5 g	En sortie d'hiver et avant floraison.
Prunier	Bactérioses	12.5 g	Durant la chute des feuilles
Melon	Bactérioses	4 g pour 10 m ²	En début de végétation