



FICHA TÉCNICA DE PLAGUICIDA

ATRALAQ®

Revisión: 00

Fecha: 07/Agosto/2014

Página: 1 de 2

| | |
|------------------------------------|--|
| Tipo de Producto: | HERBICIDA AGRÍCOLA (HER) |
| Presentaciones Comerciales: | 500 g, 1 kg |
| Grupo Químico: | Triazina |
| Nombre Químico (IUPAC): | 6-chloro-N2-ethyl-N4-isopropyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Fórmula Molecular | C ₈ H ₁₄ ClN ₅ |
| Tipo de Formulación: | Polvo Mojable (WP) |
| Concentración: | ATRAZINE 800 g/kg |
| Categoría Toxicológica: | III: Ligeramente Peligroso |
| Acción Fitosanitaria: | Herbicida sistémico selectivo para el control de ciertas malezas de hoja ancha y gramíneas en maíz. |
| Modo de acción: | Herbicida con acción sistémica y selectiva. |
| Mecanismo de acción: | Interrumpe la fotosíntesis por inhibición en el transporte de electrones en los sitios de recepción del fotosistema II, provocando la acumulación de sustancias tóxicas secundarias y produciendo la muerte de las malezas |

N° de Registro Nacional: 2 - H 45 /NA

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

| CULTIVO | MALEZA | DOSIS kg/ha | VOLUMEN DE AGUA l/ha |
|---|--|----------------|-------------------------|
| Maíz (<i>Zea mays</i>) | Ortiga (<i>Fleurya aestuans</i>) | 1.5 | 200 |
| | Lechosa (<i>Euphorbia hirta</i>) | | |
| | Betilla lila (<i>Ipomoea congesta</i>) | | |
| | Bledo hembra (<i>Amaranthus dubius</i>) | | |
| | Achochilla (<i>Momordica charantia</i>) | | |
| | Pata de gallina (<i>Eleusine indica</i>) | | |
| | Ilusión (<i>Panicum trichoides</i>) | | |
| | Guardarocío (<i>Digitaria sanguinalis</i>) | | |
| | Paja morada (<i>Leptochloa filiformis</i>) | | |
| Paja de arroz (<i>Echinochloa colona</i>) | | | |

| | |
|--|--|
| Modo de empleo: | Para preparar la mezcla, llene el tanque de aspersión hasta la mitad con agua limpia, vierta la dosis recomendada de ATRALAQ® y agite hasta obtener una solución homogénea, continúe adicionando agua hasta completar el volumen requerido. No aplicar bajo condiciones que puedan afectar los resultados: polvo sobre las hojas, aguas lodosas con alto contenido de materia orgánica, exceso de rocío sobre las hojas. Se recomienda calibrar el equipo de aspersión para lograr una distribución uniforme. |
| Época y Frecuencia de aplicación: | Para obtener óptimos resultados aplicar en pre-emergencia, antes de que broten las malezas, en post-emergencia cuando las malezas tengan entre 2 y 3 hojas máximo. Una aplicación por ciclo de cultivo. |
| Período de carencia: | 60 días. |
| Reingreso al área tratada: | 12 horas. |
| Compatibilidad: | Incompatibilidad con productos de fuerte reacción alcalina. |



FICHA TÉCNICA DE PLAGUICIDA
ATRALAQ®

Revisión: 00

Fecha: 07/Agosto/2014

Página: 2 de 2

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener a temperatura ambiente, en su empaque original, etiquetado y cerrado.

No almacenar ni transportar conjuntamente con productos de consumo humano o animal.

DISPOSICIÓN DE EMPAQUES VACÍOS:

Después de usar el contenido, destruya el empaque y entréguelo al Distribuidor para su disposición final.