

HERBICIDA

CICELIC

Ingrediente activo:	Quizalofop-p-Ethyl
Formulación:	Concentrado emulsionable
Concentración:	Quizalofop-p-Ethyl: 108 g/l
Categoría toxicológica:	III Ligeramente Peligroso
Presentaciones:	1 L, 500 ml.

USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PC (Periodo de Carencia)
Piña (<i>Ananas comosus</i>)	Caminadora: (<i>Rottboellia cochinchinensis</i>) Pata de Gallina: (<i>Eleusine indica</i>) Saboya: (<i>Panicum maximum</i>)	0.5 l/ha	No Aplica

Gasto de agua: 400 l/ha

MODO DE ACCIÓN:

CICELIC, cuyo ingrediente activo es Quizalofop-p-Ethyl, es un herbicida sistémico, absorbido desde la superficie de la hoja, con translocación a través de la planta, moviéndose tanto en el xilema como en el floema, y acumulándose en el tejido meristemático.

PERIODO DE REINGRESO:

Se debe esperar por lo menos de 12 horas para reingresar al área tratada.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

COMPATIBILIDAD:

El producto es compatible con la mayoría de pesticidas, excepto con los agentes oxidantes fuertes.

ADVERTENCIA

Use los herbicidas con la debida precaución y conocimiento de su empleo. Siga las instrucciones dadas en la etiqueta. Destruya los envases vacíos.

Importado y Distribuido por:
QUIMASA MANUCHAR S.A.

Nro. Registro: 71-H6/NA