



FICHA TÉCNICA DE PLAGUICIDA CYPERPAC®

Revisión: 01

Fecha: 10/Dic/2015

Página: 1 de 2

Formulado por:	AGRIPAC S.A.
Tipo de Producto:	INSECTICIDA AGRICOLA (INS)
Presentaciones Comerciales:	100, 250, 500 ml, 1, 4, 10, 20, 200 litros
Grupo Químico:	Piretroide
Nombre Químico (IUPAC):	(RS)- α -cyano-3-phenoxybenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-=2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate.
Fórmula Molecular	C ₂₂ H ₁₉ Cl ₂ NO ₃
Tipo de Formulación:	Concentrado Emulsionable (EC)
Concentración:	CYPERMETHRIN 200 g/l
Categoría Toxicológica:	II: Moderadamente Peligroso (Franja amarilla)
Acción Fitosanitaria:	Insecticida no sistémico para el control del Gusano cogollero en el cultivo de maíz.
Modo de acción:	Insecticida no sistémico con acción de contacto e ingestión.
Mecanismo de acción:	Insecticida neurótico de acción fulminante, paraliza el sistema nervioso del insecto ya que actúa sobre el axón, interfiriendo el paso de los átomos de sodio.

N° de Registro Nacional: 6 – I 76 / NA – CL 2

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS l/ha	VOLUMEN DE AGUA l/ha
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.30	300
Brócoli (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> , subvar. <i>cymosa</i>)	Polilla (<i>Plutella xylostella</i>)	0.30	400

Modo de Empleo:	Para preparar la emulsión, llene el tanque de aspersión hasta la mitad con agua limpia, vierta la dosis recomendada de CYPERPAC® y agite bien hasta obtener una solución homogénea, continúe adicionando agua hasta completar el volumen requerido. Lavar todos los elementos empleados, vaciando el agua de enjuague en el tanque de la mezcla. No aplicar bajo condiciones que puedan afectar los resultados: polvo sobre las hojas, aguas lodosas con alto contenido de materia orgánica, exceso de rocío sobre las hojas. Lavar bien el equipo después de su uso para evitar contaminar otros cultivos.
Época y frecuencia de aplicación:	MAIZ: Realizar una sola aplicación en presencia del Gusano cogollero. BRÓCOLI: Realizar dos aplicaciones con una frecuencia de 12 días.
Período de carencia:	MAIZ: 7 días BRÓCOLI: 3 días
Reingreso al área tratada:	24 horas.
Compatibilidad:	Compatible con los plaguicidas de uso normal que no sean alcalinos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Producto inflamable, manténgase alejado de las fuentes de calor.



FICHA TÉCNICA DE PLAGUICIDA CYPERPAC®

Revisión: 01

Fecha: 10/Dic/2015

Página: 2 de 2

Mantener a temperatura ambiente, en su envase original, etiquetado y cerrado.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Recolectar los envases y entregarlos al Distribuidor para su disposición final.