

DOMINAL 72 SL®**Biesterfeld****Herbicida***Concentrado soluble*

ACCIÓN FITOSANITARIA: Es un herbicida post-emergente, selectivo para cultivos de gramíneas. Actúa de forma sistémica contra malezas de hojas anchas anuales y perennes.

COMPOSICIÓN:

INGREDIENTES	PORCENTAJE (%)
2,4-D.....	72 % p/v
Ingredientes inertes.....	28 % p/v

PERÍODO DE CARENANCIA: Se recomienda aplicar en época temprana del cultivo aplicar solo una vez durante el ciclo dos meses antes de la cosecha, en pastos se puede aplicar siempre que sea necesario, pero tomando en cuenta que se debe esperar 15 días antes del reingreso del ganado.

TOXICIDAD: Categoría Toxicológica II. Moderadamente Peligroso.

PRECAUCIONES:

Ventilación y condiciones ambientales: No almacenar este producto en casas de habitación. Proteja el ambiente con buenas prácticas agrícolas (BPA's).

Protección respiratoria: Para evitar respirar el spray o rocío, use un respirador aprobado por NIOSH contra polvo o pesticidas.

Protección de los ojos: Para evitar el contacto con los ojos, use anteojos o lentes de seguridad contra químicos.

Protección de las manos: Para evitar el contacto con la piel, use guantes de hule.

Protección del cuerpo: Para evitar el contacto con la piel, use botas de hule, camisa de manga larga, pantalones largos y sombrero.

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS:

Ingestión: Provoque el vómito dando a beber suficiente agua tibia con sal.

Piel: Lávese la parte afectada con abundante agua y jabón.

Ojos: Lávese con agua limpia durante 15 minutos como mínimo.

Inhalación: Retire del área contaminada a la persona afectada a un lugar ventilado.

Condiciones médicas por exposición: Al manipularlo, causa irritación de ojos, nariz, garganta y piel. Al ingerirlo puede causar náuseas, vómitos, diarrea, taquicardia y acidosis.

Recomendaciones para el médico: Tratamiento debe ser sintomático. En caso de ingestión provocar.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO: Este producto debe mantenerse en su envase original, debidamente cerrado, etiquetado y con su panfleto. Manténgalo en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave.

PRESENTACIONES:

Envase x 250 cc.

Envase x 500 cc.

Envase x 1 litro.

Envase x 10 litros.

Envase x 20 litros.

Envase x 200 litros.

REGISTRO: 3 H71 – NA.

DOSIS DE DOMINAL 72 SL:

CULTIVO	PLAGA - ENFERMEDAD		DOSIS l/ha
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	
MAÍZ	Capín	<i>Echinochloa crusgalli</i>	1.5 – 1.5
SORGO	Abrojo	<i>Xanthium cavanillesii</i>	
	Cardo	<i>Carduus acanthoides</i>	2.0 – 3.0
	Chamico	<i>Datura feroz</i>	
	Enredadera anual	<i>Polygonum convolvulus</i>	
	Yuyo colorado	<i>Amaranthus spp.</i>	
	Quínoa	<i>Chenopodium album</i>	
CAÑA DE AZÚCAR	Nabo	<i>Brassica campestris</i>	
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	
	Pasto de invierno	<i>Poa annua</i>	
	Cola de zorro	<i>Setaria geniculata</i>	
	Paspalum	<i>Paspalum distichum</i>	