



FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Grupo: Fertilizante foliar orgánico quelatado con metabolitos extraídos de procesos de fermentación multi-etapa de microorganismos y de extracto de alga *Ascophyllum nodosum*.

Grado: Fertilizante en base a elicitores y antioxidantes.

Fabricante/Formulador: Cytozyme Laboratories Inc., USA

Distribuidor en Ecuador: Agrobimsa S.A.

COMPOSICIÓN

CONCENTRACIÓN	
Magnesio (MgO)	11,7% (p/v)
Nitrógeno Orgánico (N)	4,0% (p/v)
Glicina-Betaína	1,50% (p/v)
Actividad Antioxidante	2.933 µMol Trolox
Elicitores: Alginatos, Carragenanos, Laminarina y Fucanos.	
Agentes quelatantes orgánicos: aminoácidos, ácidos carboxílicos, péptidos y carbohidratos. Extracto de alga <i>Ascophyllum nodosum</i> .	

Densidad a 200C: 1,25 g/ml

pH: 4,0-5,0

Formulación: Concentrado Soluble-SL

Modo de acción: Bioelicitor con Magnesio quelatado y antioxidantes.

MODO DE ACCIÓN

BioNutriente Magnesio+ puede incrementar el rendimiento y la calidad de las cosechas por los siguientes mecanismos:

1. Contiene antioxidantes que neutralizan los radicales libres reduciendo los efectos del estrés abiótico.
2. Posee elicitores que activan la expresión de genes de diferentes rutas metabólicas secundarias para reducir estrés biótico y abiótico, mejorando la producción y calidad de las cosechas.
3. Posee componentes orgánicos bioactivos que aumenta la expresión de los genes de la ruta metabólica de los flavonoides y fenil-propanoides y la síntesis de lignina, antocianos y fitoalexinas.
4. Diversidad de agentes quelatantes para una absorción y traslocación más rápida, 2 horas posterior a la aplicación ya ha penetrado en un 100%, sin el riesgo de ser lavado por lluvia.
5. Nutrición para la prevención y corrección de las deficiencias de Magnesio de las plantas.

FUNCIONES	BENEFICIOS DEL USO	SÍNTOMAS DE DEFICIENCIA
Mejor actividad enzimática. Afecta la Traslocación del Fósforo.	Mejora la resistencia al estrés y enfermedades. Mejora las reacciones enzimáticas.	Clorosis intervenal en hojas adultas, color amarillo en forma de V invertida.

Forma parte de la estructura de la clorofila.
Antioxidante.

Mejora la capacidad de fotosíntesis de la planta con menor intensidad de luz.

FORMA DE USO

CULTIVO	MOMENTO APLICACIÓN	DOSIS	Nº APLICACIONES
Banano	Solo en condiciones de déficit	0,5 l/ha	1 a 3
Cacao	Formación de fruto	0,5 l/ha	1
Mango	Desarrollo de fruto	0,5 l/ha	1 a 3
Frutales	Desarrollo de fruto	0,5 l/ha	1 a 3
Café	Amarre	0,5 l/ha	1
Caña de Azúcar	Periodo de crecimiento	0,5 l/ha	1
Palma	Solo en condiciones de déficit	0,5 l/ha	1
Arroz	Embuchamiento	0,5 l/ha	1
Maíz	Inicio formación de grano	0,5 l/ha	1
Uva (de mesa y vinífera)	Brote (10 a 50 cm) Durante desarrollo de fruto	1-4 l/ha 1-4 l/ha	1 a 2 2 a 3
Tomate, Pimentón, Cucurbitáceas	5 días después del trasplante	1-4 l/ha	1
Papa	Inicio formación tubérculo	0,5-1 cc/l	1
Rosas	30 días después de la siembra	0,5 -2 cc/l	1
Hortalizas	4 a 5 hojas	0,75 cc/l	1

TIEMPO PARA REINGRESO

No aplica, puede ingresarse al terreno inmediatamente. Si se aplica en mezcla con plaguicidas respetar las indicaciones de la etiqueta.

INSTRUCCIONES DE USO

Agitar bien el envase antes de usar. Diluya con suficiente agua para obtener un cubrimiento uniforme. Lluvias fuertes o irrigación aérea durante las 4 horas siguientes a la aplicación pueden reducir su efectividad. Para resultados óptimos, aplique en horas tempranas de la mañana o en las últimas horas de la tarde.

COMPATIBILIDAD

BioNutriente Magnesio+ es compatible con la mayoría de los pesticidas comunes del mercado. Sin embargo, es aconsejable realizar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

BioNutriente Magnesio+ puede actuar como transportador de otros pesticidas mejorando su absorción. Por esta razón se recomienda realizar una prueba antes de aplicar en mezcla con productos azufrados o con LI 700.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

No contamine fuentes de agua, ríos, lagos, lagunas, estanques con envases vacíos. Destruya los envases vacíos. En la dosis recomendada, no se ha reportado ningún daño en animales silvestres, abejas, animales domésticos, o peces.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Este producto no debe almacenarse ni transportarse con forrajes, alimentos, medicamentos, utensilios de uso personal o pecuario. Manténgase el producto en un lugar fresco y aireado, bien cerrado, en su envase original y etiquetado, a temperaturas entre 43°C y 5°C.



Dirección: Cdla. Guayaquil, Mz.4 Sl.22
Teléfono: (+593) 093-977-9536
Email: info@agrobimsa.com
Guayaquil – Ecuador

