

TANATO

INSECTICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

CHLORPYRIFOS..... 480 g/l

Registro Nacional: 26-I51/NA-CL1

Formulación: Concentrado emulsionable (EC)

Concentración del I.A.: 480g/L - 48%

Estado Físico: Líquido.

Color: Café.

Olor: Aromático.

Densidad (g/ml): 1,081

pH: 4.1

Punto de inflamación: >45°C

Estabilidad de almacenamiento: Estable.

Corrosión: No corrosible al plástico ni aluminio.

Inflamabilidad: No inflamable

Incompatibilidad química: Ácidos fuertes y sustancias alcalinas.



QUÉ ES TANATO?

Insecticida de acción por contacto, ingestión e inhalación. Especialmente usado para el control de Trips en papa, Gusano cogollero en maíz y Chinche en arroz.



TANATO

INSECTICIDA AGRÍCOLA



INSTRUCCIONES DE USO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga	Dosis (l/ha)	PC (Periodo de carencia)
PAPA (<i>Solanum tuberosum</i>)	Trips (<i>Frankliniella tuberosi</i>)	0.50*	21 días
MAIZ (<i>Zea mays</i>)	Gusano Cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.75*	21 días
ARROZ (<i>Oryza sativa</i>)	Chinche (<i>Oebalus ornatus</i>)	0.75*	20 días
ESPÁRRAGO (<i>Asparagus Officinalis</i>)	Gusano Cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.60*	21 días

*PAPA: volumen de agua 400 litros por hectárea.

*MAÍZ: volumen de agua 200 litros por hectárea.

*ARROZ: volumen de agua 300 litros por hectárea.

PERIODO DE REINGRESO: Se debe esperar por lo menos 24 horas antes de reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: Este producto es compatible con la mayoría de productos agroquímicos, se recomienda hacer una prueba a pequeña escala, para garantizar su compatibilidad.

PRESENTACIONES

Envase de 100ml
Envase de 250 ml
Envase de 500 ml
Envase de 1 Litro
Caneca de 5 Galones

MODO DE EMPLEO:

Vierta la dosis recomendada del insecticida en la mitad del agua requerida, mezcle agitando lentamente hasta obtener una mezcla homogénea. Complete el volumen total con agua, sin dejar de agitar. Cubrir el follaje homogéneamente. Es importante agitar la mezcla antes de cada aplicación.

PAPA: Aplicar TANATO en presencia de la plaga; es decir, cuando el ataque en el área foliar sea de aproximadamente 20%. Se recomienda hacer dos aplicaciones por cultivo, con un intervalo de 14 días.

MAÍZ: Aplicar el producto en presencia de la plaga y por una sola ocasión, cubriendo en forma homogénea la panícula de la planta.

ARROZ: Aplicar el producto en presencia de la plaga cubriendo en forma homogénea la panícula de la planta. Se recomienda realizar la aplicación por una sola ocasión.